

فیروماتوزیس متعدد سطحی پوست

دکتر سعدالله شمس الدینی^۱، دکتر شهریار دبیری^۲

خلاصه

مرد ۵۰ ساله‌ای متولد و ساکن کرمان به علت وجود خمایعات متعدد و سفت در کف هر دو دست به درمانگاه پوست بیمارستان مراجعه می‌نماید. سابقه پیدایش ضمایعات را از ده سال قبل ذکر می‌کند که ابتدا این ندول‌ها در کف پا بوده و بتدریج ضمایعات جدیدتری در دست‌ها پیدا شده بطوریکه در شش سال قبل مبادرت به برداشتن دو عدد از ضمایعات کف پا توسط جراح می‌نماید که جوشگاه آن مشهود می‌باشد. در معاینه بالینی از بیمار ندول‌های کروی یا یپسیوی شکل به رنگ زرد تیره با قوام سفت در کف دستها وجود داشت که در لمس و فشار مختصراً در دنایک گشته ولی در حال عادی سبب جمع شدن و محدودیت در حرکت انگشتان دست شده بودند. وجود ضمایعات متعدد مشابه در کف پاها و نیز در آلت تناسلی بیمار همراهی سه سندروم «دوپوآترن، لدرهس و پیرونی» برای بیمار مطرح گردید. که با برداشتن یکی از ندول‌ها و ارسال به پاتولوژیست وجود ضمایعه محدود فیروماتوزیس پوست تأیید شد. همراهی این سه سندروم اگرچه گزارش شده ولی نادر می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: فیروماتوزیس، سندروم دوپوآترن، سندروم پیرونی، سندروم لدرهس.

توانایی و در دنایک شدن عمل آمیزش در حین مقابله شکایت می‌نماید که به سبب انحراف به راست ییش از حد آلت تناسلی وی می‌باشد. در معاینه تعداد ندول‌ها در دست راست ۵ عدد و دست چپ ۲ عدد، پای راست و چپ هر کدام ۲ عدد و در سمت راست آلت تناسلی وی ۳ عدد وجود داشت که قوامی سفت و به بافت زیر جلدی چسبیده بودند. تعداد کل ضمایعات با نضمایم دو عددی که قبل از برداشته شده‌اند جمماً شانزده عدد می‌شوند و تعداد آنها با گذشت زمان افزایش می‌یابد. فعلاً مشکل بیمار در راه رفتن، انجام کارهای دستی و انجام عمل آمیزش می‌باشد و اضطراب ناشی از این محدودیت‌های کاری در سیمای بیمار مشهود می‌باشد. در معاینه کلی و سیستمیک بیمار و بررسی

معرفی بیمار

مرد ۵۰ ساله‌ای کشاورز اهل و ساکن کرمان متأهل و دارای شش فرزند، چهار پسر و دو دختر، بعلت وجود ضمایعات متعدد سفت در کف دستها به درمانگاه بیمارستان مراجعه می‌نماید. سابقه بروز ضمایعات را از ده سال قبل ذکر می‌کند که ضمایعات ندولر و سفت در کف هر دو پیدا شده بطوری که راه رفتن را برای بیمار مشکل گرده بودند، بیمار به جراح مراجعه می‌نماید در نتیجه دو عدد از ندول‌های کف پا برداشته می‌شود بطوریکه جایگاه آنها را در کف پا می‌توان مشاهده نمود، هیچ سابقه‌ای از ارسال نمونه‌ها به پاتولوژی و یا عدم ارسال آنها را نمی‌داند. او در ادامه شرح حالش اخیراً از گسترش ضمایعات به آلت تناسلی و عدم

۱- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بیمارستان شماره ۱.

۲- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

ضایعات معمولاً بین ۵۰-۷۰ سالگی بوده وندولها خودبخود دردناک نیستند (۳). در این بیمار با توجه به اینکه شغل او کشاورزی بوده و در حین کارکردن ندولهای چسبیده به تاندونها در کانال تاندونی کف دستهاتحت فشار قرارگرفته ضایعات دردناک شده بودند. در بیماری لدرهس (Ledderhose's disease) ندولها فقط در کف پاها پیدا شده و مشکل راه رفتن را در بیمار ایجاد می‌نماید (۲). وجود فیروماتوزیس سطحی در پوست آلت تناسلی را سندروم پیرونی (Peyronie's syndrome) نامیده‌اند (۲).

همراهی این سه سندروم با هم گزارش شده ولی نادر می‌باشد در حالیکه همراهی دو تا از سندرم‌های فوق الذکر با یکدیگر به فراوانی دیده می‌شود (۴). بیمار ما هر سه سندروم را با هم داشت، یکی از ندولهای کف دست بیمار برداشته شد و به پاتولوژیست ارسال گردید. در مقطع میکروسکوپی رنگ آمیزی شده از نمونه ارسالی افزایش موضعی میووفیربلاست‌ها به همراه باندهای کلائزی دیده می‌شود که توأم با افزایش شدید لایه شاخی و فراوانی وسیع کلائزی هیبری‌پلاستیک تشخیص، تأثید می‌گردد. بیمار با تشخیص فیروماتوزیس متعدد سطحی پوست تحت درمان با استروئید طوبیل‌الاثر به صورت تزریقی و داخل ضایعات قرار می‌گیرد و توأم با آن ویتامین E خوراکی روزانه ۱۰۰ میلی‌گرم داده می‌شود (۱). پس از سه نوبت تزریق استروئید به فواصل یک ماهه در حالیکه از نظر بالینی تغییری واضح در اندازه ندولها دیده نمی‌شود، بیمار احساس راحتی نسبی را اعلام می‌نماید.

دستگاههای مختلفه بدن نکه مثبت ارزش داری به جز همان افسردگی ناشی از عدم بهبودی و گسترش آن به دیگر نقاط بدن یافته نگردید. در بررسی‌های آزمایشگاهی و اقدامات پاراکلینیکی روتین به عمل آمده بجز افزایش مختصر کلسترول خون نکه دیگری دیده نشد.



بحث

معمولًا جمع شدگی یا کتراکشن انگشتان دست ناشی از فیروماتوز سطحی پوست را بیماری دوپواترن (Dupuytren's disease) می‌نامند که بیماری با زمینه ژنتیکی بوده و در کشورهای اروپائی منجمله نروژ شایع ولی در قاره‌های آفریقا و آسیا نادر می‌باشد (۲). شروع سنی بروز

Summary

Superficial Multiple Fibromatosis (combined 3 syndromes)

S. Shamsadini, MD*; Sh. Dabiri, MD**

*Assistant Professor of Dermatology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

**Assistant Professor of Pathology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

A 50 year old male patient is referred to our clinic for multiple hard diffused lesions on palms, plantars and penis. The genesis of the problem goes back to 10 years earlier. The lesions appeared first on the soles and gradually new lesions appeared on the palms and eventually on the penis, so that stretching and contraction of the fingers and toes has become painful. During the last 6 years, two times he has been operated upon and the lesions are removed. Now he has developed the problem of penis curvature, and feels severe pain after erection, especially at the time of copulation. Isolated fibromatous of palm is named Dupuytren's syndrome. Pure lesions of sole are named as Ledderhose's disease and pure lesions on the penis are named as peyronie's syndrome. Deep skin biopsy is done and superficial multiple fibromatosis is confirmed.

Journal of Kerman University of Medical Sciences. 1994;(1);46-48.

Key Words: Fibromatosis, Dupuytren's disease, Ledderhose's disease, Peyronie's disease.

References

- 1- Arnold HL, Odom RB, et al: Andrew's diseases of the skin. 8th ed. Philadelphia, W.B Saunders, 1990;p710.
- 2- Burton JL, Ebling FJG: Disorder of connective tissue. In Rook A, Wilkinson DS, et al (eds): Text book of dermatology. 4th. London, Blackwell Scientific Publications, 1986;p1824-1828.
- 3- Demis DJ: Clinical dermatology 19th rev. Philadelphia, Lippincott. 1992;(1);pp27-31.
- 4- Scripps, et al: Multiple fibromatosus. Research Foundation and UC 50 1989;P179.