

مقایسه میزان سرمی فسفر، آلبومین و پروتئین کل در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی و حاملگی طبیعی

دکتر زهره سالاری^{۱*}، دکتر ناهید افتخاری^۲ و مهدیه تاج‌الدینی^۳

خلاصه

مقدمه: پره‌اکلامپسی هنوز یکی از مشکلات مهم طب مامایی می‌باشد که یک سری عوامل در بروز یا تشدید آن مطرح گردیده است. کاهش سطح سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر نیز در برخی بررسی‌ها به عنوان یک عامل در پاتوفیزیولوژی پره‌اکلامپسی مطرح شده است. هدف از این تحقیق، مقایسه سطح سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر در دو گروه مبتلا به پره‌اکلامپسی و بدون پره‌اکلامپسی می‌باشد.

روش: این مطالعه از نوع مورد شاهدی بوده و در آن تعداد ۱۰۰ خانم باردار ۲۰-۳۰ ساله که حاملگی اول آنها بوده و سن حاملگی آنها بین ۲۸-۴۰ هفته بود انتخاب شدند. افراد فوق به دو گروه مساوی مبتلا به پره‌اکلامپسی و حاملگی طبیعی تقسیم شدند. میزان سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر در دو گروه اندازه‌گیری شده و با هم مقایسه گردید.

یافته‌ها: مشخصات جمعیتی در دو گروه مشابه بود. میانگین سنی افراد در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت، اما میانگین سن حاملگی به لحاظ آماری معنی‌دار بود (در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی $36/29 \pm 3/2$ هفته و در افراد با حاملگی طبیعی $38/19 \pm 2/5$). میانگین متغیرهای فشارخون سیستولی و دیاستولی و شاخص توده بدنی در خانم‌های مبتلا پره‌اکلامپسی و بدون پره‌اکلامپسی تفاوت آماری معنی‌دار داشت ($P < 0.001$). میانگین فشارخون سیستولی در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی $149/84 \pm 13/39$ و در افراد با حاملگی طبیعی $108/79 \pm 7/23$ بود و میانگین فشارخون دیاستولی در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی $95/57 \pm 8/57$ و در افراد با حاملگی طبیعی $67/44 \pm 10/72$ بود. شاخص توده بدنی در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی $22/84 \pm 2/07$ و در افراد با حاملگی طبیعی $21/21 \pm 2/09$ بود. بین دو گروه مورد مطالعه از نظر سطح سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. آلبومین سرم در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی $4/12 \pm 0/45$ و در افراد با حاملگی طبیعی $4/26 \pm 0/57$ بود. میانگین میزان سرمی پروتئین کل در گروه اول $5/95 \pm 1$ و در گروه دوم $6/03 \pm 0/92$ بود و میانگین میزان سرمی فسفر در گروه اول $3/52 \pm 0/68$ و در گروه دوم $3/35 \pm 0/82$ بود.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه ارتباطی بین میزان سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر در بروز پره‌اکلامپسی مشاهده نگردید.

واژه‌های کلیدی: پره‌اکلامپسی، آلبومین، پروتئین کل، فسفر

۱- استادیار مامایی و بیماری‌های زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کرمان-۲- دانشیار، مامایی و بیماری‌های زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کرمان-۳- کارورز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کرمان
* نویسنده مسؤول: گروه مامایی و بیماری‌های زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان-۰- آدرس پست الکترونیک:
دریافت مقاله: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ دریافت مقاله اصلاح شده: ۱۳۸۵/۷/۲۵ پذیرش مقاله: ۱۳۸۵/۹/۱

مقدمه

این مطالعه از نوع مورد - شاهدی است که در آن تعداد ۱۰۰ خانم باردار با حاملگی اول که در محدوده سنی ۲۰-۳۰ سال بوده و سن حاملگی ۲۸-۴۰ هفته داشتند، انتخاب شدند. این بررسی در بخش زنان و مامایی بیمارستان افضلی پور شهر کرمان در سال ۱۳۸۲ انجام شد. بیمارانی که دارای عوامل مخدوش کننده‌ای همچون چاقی، سابقه بیماری زمینه‌ای از قبیل پرفشاری خون مزمن، بیماری کلیوی، قلبی عروقی و وجود علائمی از ناهنجاری جنینی و یا چند قلویی در سونوگرافی بودند از این مطالعه حذف گردیدند.

از این ۱۰۰ خانم باردار، ۵۰ نفر مبتلا به پره‌اکلامپسی (فشارخون مساوی یا بیشتر از ۱۴۰/۹۰ میلی‌متر جیوه به اضافه پروتئین ادرار ۲۴ ساعته 300 mg یا بیشتر (۳،۱۶) و ۵۰ نفر دیگر خانم‌های با حاملگی طبیعی بودند. در هر گروه سطح سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر یک نوبت اندازه گیری شد. اندازه گیری با دستگاه selectra ساخت هلند انجام شد (حد طبیعی پروتئین کل $۷/۸-۸/۶$ گرم درصد و آلبومین $۴/۲-۳/۷$ گرم درصد، فسفر $۴/۸-۵/۲$ میلی‌گرم درصد می‌باشد). اطلاعات در فرمی که به صورت پرسشنامه تهیه شده بود، جمع‌آوری گردید.

روش‌های آمار توصیفی و آزمون t-test جهت تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت و $P<0.05$ سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

نتایج

میانگین سنی دو گروه با یکدیگر تفاوتی نداشت (26.02 ± 3.7 سال در گروه مبتلا به پره‌اکلامپسی و 25.36 ± 3.55 سال در گروه با حاملگی طبیعی با $P=0.36$). اما میانگین سن حاملگی در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری داشت (در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی 36.29 ± 3.2 هفتۀ و در افراد با حاملگی طبیعی 38.19 ± 2.5 هفتۀ بود با $P=0.002$).

مقایسه دو گروه مورد مطالعه از نقطه نظر متغیرهای فشارخون سیستولی، دیاستولی و شاخص توده بدنی حاکی از تفاوت آماری معنی‌داری بین دو گروه بود.

همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، میانگین فشارخون سیستولی در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی 13.39 ± 1.13 و در افراد با حاملگی طبیعی 10.87 ± 0.73 بود ($P<0.001$) و میانگین

حدود ۵ درصد خانم‌های حامله مبتلا به پره‌اکلامپسی می‌باشد و این بیماری باعث افزایش مرگ‌ومیر و ناتوانی مادر و جنین می‌شود. اختلالات فشار خون در حاملگی هنوز مهم‌ترین مشکل حل نشده در طب مامایی است (۳،۹). با وجود چند دهه تحقیق گسترده هنوز علت افزایش فشارخون در اثر حاملگی حل نشده باقی‌مانده است (۹). بنابراین جلوگیری از بروز آن در واقع غیرممکن است. تشخیص پرفشارخون حاملگی در زنانی مطرح می‌شود که اولین بار در طی حاملگی فشارخون آنان به $140/90\text{ mmHg}$ رسیده، اما حداقل معیارهای لازم برای تشخیص پره‌اکلامپسی پرفشاری به اضافه پروتئینوری می‌باشد (۳،۱۳). در بررسی‌های دهه‌های گذشته یک سری عوامل خطر اساسی برای پره‌اکلامپسی مطرح شده‌است. تغییرات متابولیسم آلبومین، پروتئین کل و فسفر نیز به عنوان یک فرضیه مطرح گردیده است (۱۱،۱۵). در برخی مطالعات سطح سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی پایین‌تر از زنان حامله طبیعی گزارش شده است (۲۷،۱۶) و در برخی مطالعات در دو گروه اختلافی در سطح سرمی عوامل مورد نظر مشاهده نشده است (۷) و در برخی بررسی‌ها نیز سطح این عوامل افزایش یافته است (۱۷).

با توجه به شیوع بالای پره‌اکلامپسی (۵٪) و به دلیل اینکه در صورت عدم کنترل آن، ناتوانی و مرگ‌ومیر مادر و جنین افزایش می‌یابد، پیدا کردن راه حلی برای کاهش هرچه بیشتر میزان یا شدت آن ضروری است. با توجه به اینکه عواملی همچون نژاد، رنگ و قومیت نیز در میزان بروز پره‌اکلامپسی نقش دارند، در این مطالعه سطح سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر در خانم‌های حامله شهر کرمان تعیین شد تا با توجه به شرایط موجود این منطقه ارتباط بین این عوامل در دو گروه مورد مطالعه بررسی شود.

نظر به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین علت مرگ‌ومیر خانم‌های حامله در شهر کرمان، پره‌اکلامپسی می‌باشد، در صورتی که در مطالعه فوق بین کاهش میزان سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر و بروز پره‌اکلامپسی ارتباطی پیدا شود باستی درصد یافتن راهکارهایی جهت حل این معضل برآمد تا از این طریق گامی جهت کاهش این عارضه مهلک برداشته شود.

بودن میانگین میزان سرمی فسفر در این افراد بود، اما اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت. میانگین میزان سرمی آلبومین در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی $4/12 \pm 0/45$ و در افراد حاملگی طبیعی $4/26 \pm 0/57$ بود، میانگین میزان سرمی پروتئین کل در گروه مبتلا به پره‌اکلامپسی $5/98 \pm 1/05$ و در گروه با حاملگی طبیعی $6/03 \pm 0/92$ بود، میانگین میزان سرمی فسفر در گروه اول $6/8 \pm 0/53$ و در گروه دوم $8/2 \pm 0/35$ بود.

فشارخون دیاستولی در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی $95 \pm 8/57$ و در افراد با حاملگی طبیعی $74 \pm 10/72$ بود ($P < 0/001$).

شاخص توده بدنی در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی $22/84 \pm 2/07$ و در افراد با حاملگی طبیعی $21/21 \pm 2/09$ بود ($P < 0/001$). مقایسه میانگین میزان سرمی متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه حاکی از پایین‌تر بودن میانگین میزان سرمی آلبومین و پروتئین کل در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی و بالاتر

جدول ۱: مقایسه فشارخون سیستولی، دیاستولی و شاخص توده بدنی در افراد مبتلا

پره‌اکلامپسی و بدون پره‌اکلامپسی

P	میانگین \pm انحراف معیار		متغیر
	با پره‌اکلامپسی	بدون پره‌اکلامپسی	
$<0/001$	$149/8 \pm 13/39$	$10/87 \pm 9/73$	mm/Hg فشارخون سیستولی
$<0/001$	$95 \pm 8/57$	$66/74 \pm 10/72$	mm/Hg فشارخون دیاستولی
$<0/001$	$22/84 \pm 2/07$	$21/21 \pm 2/09$	kg/m ² شاخص توده بدنی

معنی‌داری پایین‌تر از گروه بدون پره‌اکلامپسی بود که با توجه به اینکه در پره‌اکلامپسی گاهی شرایطی بوجود می‌آید که پزشک مجبور به ختم حاملگی زودتر از موعد زایمان می‌شود، می‌توان این اختلاف را توجیه نمود (۳).

شاخص توده بدنی در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی بالاتر از افراد بدون پره‌اکلامپسی بود که با توجه به مطرح بودن چاقی به عنوان یکی از عوامل خطرزای پره‌اکلامپسی (۱،۱۰) می‌توان این مسئله را توجیه نمود و بر کاهش وزن خانم‌های چاق قبل از بارداری تأکید کرد.

در مطالعه اخیر در بررسی میزان سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر اختلاف معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت. در مطالعه‌ای که توسط Gojnic و همکاران در سال ۲۰۰۴ انجام شده به این نتیجه رسیده‌اند که هیپوآلبومنی در پره‌اکلامپسی در نتیجه کاهش جریان خون کبدی ثانوی به هیپوولمی ایجاد می‌شود. بنابراین هیپوآلبومنی می‌تواند به صورت یک علامت زودرس در پره‌اکلامپسی بروز کند. در این مطالعه افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی شدید سطح سرمی آلبومین در حد کمتر از 3 g/dl داشتند، در حالی که بقیه افراد سطح سرمی آلبومین $3-5\text{ g/dl}$ داشتند در این مطالعه سطح

بحث اختلالات پرفشاری خون در بارداری، هنوز مهم‌ترین مشکل در طب مامایی بوده و یکی از علل مهم ناتوانی و مرگ‌ومیر مادر و جنین محسوب می‌شوند (۱۸).

با وجود چند دهه تحقیق گسترده، هنوز چگونگی آغاز افزایش فشارخون در حاملگی حل نشده است (۱۲). در بررسی‌هایی که طی دهه‌های گذشته انجام شده، انواع مختلفی از عوامل بیوشیمیایی و بیوفیزیکی را در پاتولوژی اختلالات پرفشاری خون بارداری دخیل دانسته‌اند. از جمله عواملی که در پاتوفیزیولوژی پره‌اکلامپسی به صورت فرضیه مطرح شده، تغییراتی در سطح سرمی متغیرهای همچون آلبومین، پروتئین کل و فسفر می‌باشد و برخی مطالعات بر کاهش این متغیرها در پره‌اکلامپسی تأکید نموده‌اند (۲،۴). به همین دلیل در این مطالعه میزان سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر در خانم‌های حامله مبتلا به پره‌اکلامپسی و بدون پره‌اکلامپسی بررسی شد. در دو گروه مورد بررسی فشارخون سیستول و دیاستول اختلاف آماری معنی‌داری داشت که با توجه به بالاتر بودن فشارخون در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی این اختلاف دور از انتظار نمی‌باشد (۳،۱۵). از طرفی سن حاملگی افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی نیز بهطور

خانم‌های باردار نسبت به غیر باردار کاهش یافته بود و در افراد مبتلا به PIH سطح سرمی پروتئین کل، آلبومین و فسفر بیشتر کاهش یافته بود (۱۶).

Vasiljevic و همکاران (۱۹۹۶) با توجه به این مطلب که عوامل مختلفی از جمله تغذیه در ایجاد پرها کلامپسی نقش دارند، مطالعه‌ای در مورد نقش تغذیه در پرها کلامپسی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که عناصر تغذیه‌ای از جمله پروتئین‌ها، لیپیدها، کلسیم، ویتامین D، سدیم، منیزیم و روی در بروز پرها کلامپسی و اکلامپسی نقش دارند و مشاوره تغذیه در دوران پری‌ناتال را توصیه نمودند (۱۸).

در بررسی Yang و همکاران که در سال ۱۹۹۵ بر روی مطالعه‌یان به پرها کلامپسی انجام شد، سطح پروتئین کل و آلبومین در گروه با دیسترس جنینی پایین‌تر بود (۱۹).

Bartha و همکارانش در سال ۱۹۹۹ در یک بررسی به این نتیجه رسیدند که سطح نیتریت‌ها در زنان مبتلا به پرها کلامپسی نسبت به گروه کنترل بالاتر بوده است و رابطه منفی با شمارش پلاکتی و سطح سرمی فسفر دارد (۲). با توجه به مطالعات انجام شده سطح سرمی آلبومین، پروتئین کل و فسفر در افراد مبتلا به پرها کلامپسی کاهش می‌یابد اما در مطالعه حاضر این نتیجه حاصل نگردید. در صورتی که این بررسی در جمعیت بیشتری انجام شود شاید بتوان نظر قطعی تری در این مورد داد.

سرمی آلبومین را به عنوان یک معیار پیش‌بینی کننده پرها کلامپسی شدید دانستند (۴).

در مطالعه‌ای که توسط Makugana و همکاران در سال ۲۰۰۲ انجام شد، آزمون‌های عملکرد کبد و کلیه در افراد مبتلا به پرها کلامپسی و افراد با حاملگی طبیعی مقایسه گردید که سطح سرمی آلبومین، بیلی‌رویین کل، آلکالین فسفاتاز و آلانین ترانس‌آمیناز در دو گروه تقاضی نداشت (۸).

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۳ توسط Salako و همکاران انجام شد، سطح سرمی آلبومین، کراتینین و اسیداوریک در خانم‌های حامله‌ای که جهت مراقبت‌های بارداری مراجعه نموده بودند قبل از هفته ۲۰ حاملگی اندازه گیری شد. این افراد از نظر ابتلا به پرها کلامپسی و فشارخون حاملگی بی‌گیری شدند که ۷/۷٪ افراد مبتلا به پرها کلامپسی و ۸/۷٪ مبتلا به فشارخون به تنها ۶/۶۹٪ حاملگی طبیعی داشتند. میانگین غاظت سرمی اسیداوریک و کراتینین در دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت ولی میانگین سطح سرمی آلبومین به طور معنی‌داری در گروه مبتلا به پرها کلامپسی بیشتر از گروه با حاملگی طبیعی بود (۱۴) ۰/۰۶±۰/۰۶ در مقابل ۰/۳۳±۰/۳۳ در.

در مطالعه Mac Gillivary و همکاران در سال ۱۹۷۶، هیچ اختلافی در سطح سرمی آلبومین و پروتئین کل در افراد مبتلا به پرها کلامپسی و افراد طبیعی دیده نشد (۷).

در مطالعه‌ای دیگر که توسط Siddiqui و همکاران در سال ۱۹۹۳ انجام شد سطح سرمی پروتئین کل، آلبومین و فسفر در

Summary

The Comparison of Total Protein, Albumin and Phosphorus Level in Preeclamptic Pregnant Women and Women with Normal Pregnancy

Salari Z., MD.¹, Eftekhar N., MD.², Tajaddini M., Intern³

1. Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2. Associate Professor of Obstetrics & Gynecology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran 3. Intern

Introduction: *Preeclampsia has remained one of the important obstetrical problems for which different factors have been suggested. Decrease of serum levels of albumin, total protein and phosphorous have been suggested in the pathophysiology of preeclampsia. The aim of this study was to determine serum levels of Albumin, total protein and phosphorous in normal pregnancy and preeclamptic women.*

Methods: *In this case-control study, 100 pregnant women aged 20 to 30 years with the gestational age of 28 to 40 weeks were studied. Patients were divided into two groups: 50 women as case group (preeclampsia) and 50 women as control group (normal pregnancy). The serum levels of Albumin, total protein and phosphorous were measured in both groups.*

Results: *There were no significant difference between two groups in demographic factors and mean maternal age but duration of pregnancy was significantly different in the two groups (36.29±3.2 weeks in case group and 38.19±2.5 in*

control group) ($P<0.0001$). The mean systolic and diastolic blood pressure and body mass index were significantly different in both groups ($P<0.0001$). The mean systolic blood pressure in preeclamptic women was 149.8 ± 13.39 and in normal group was 108.7 ± 9.73 and the mean diastolic blood pressure in preeclamptic women was 95 ± 8.57 and in normal group was 67.4 ± 10.72 . Body mass index was 22.84 ± 2.07 in preeclamptic women and in normal pregnant was 21.21 ± 2.09 . There was no significant difference between the two groups in mean serum levels of albumin, total protein and phosphorous. Serum Albumin in preeclamptic women was 4.12 ± 0.45 and in women with normal pregnancy was 4.26 ± 0.57 . Serum level of total protein was 5.95 ± 1 and 6.03 ± 0.92 and serum phosphorous was 3.53 ± 0.68 and 3.35 ± 0.82 in preeclamptics and normals respectively..

Conclusions: There was no significant relationship serum between levels of Albumin, total protein and phosphorous and preeclampsia.

Key words: Preeclampsia, Albumin, Total protein, Phosphorous

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2006; 13(4): 209-214

منابع

۱. افتخاری، ناهید؛ نیکیان، یدا... و خالقی، فریده: ارتباط چاقی با پرها کلامپسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، ۱۳۷۹، ۴، شماره ۴-۲۰، ص ۴-۲۰.

2. Bartha J.L, Comino-Delgado R, Bedoya F.J, Barahona M, Lubian D, Garcia-Benach F. Maternal serum nitric oxide levels associated with biochemical and clinical parameters in hypertension in pregnancy. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1999; 82(2): 201-7.
3. Cunningham G, Gant N.F, Leveno KG, Gilstron L.C, Haut J.C, Westrom K.D: Williams obstetrics & Gynecology. Vol 2, 21th ed., New York, McGraw-Hill 2001; Vol 2, PP: 336-65.
4. Gojnic M, Petkovic S, Papic M, Mostic T, Jeremic K, Vilendecic Z, Djordjevic S. Plasma albumin level as an indicator of severity of preeclampsia. *Clin Exp Obstet Gynecol* 2004; 31(3): 209-10.
5. Hanisch C.G, Pfeiffer K.A, Schlebusch H, Schmolling J. Adhesion molecules, activin and inhibin-candidates for the biochemical prediction of hypertensive diseases in pregnancy. *Arch Gynecol Obstet* 2004; 270(2): 110-5.
6. Hayashi M, Ueda Y, Hoshimoto K, Ota Y, Fukasawa I, Sumori K, et al. Changes in urinary excretion of six biochemical parameters in normotensive pregnancy and preeclampsia. *Am J Kidney Dis* 2002; 39(2): 392-400.
7. MacGillivray I, Campbell D, Pirani BB. Changes preceding the development of preeclamptic toxemia. *Isr J Med Sci* 1976; 12(6): 504-7.
8. Makuyana D, Mahomed K, Shukusho FD, Majoko F. Liver and kidney function tests in normal and pre-eclamptic gestation. *Cent Afr J Med* 2002; 48(5-6): 55-9.
9. Malas N.O, Shurideh Z.M. Dose serum calcium in pre-eclampsia and normal pregnancy differ? *Saudi Med J* 2001; 22(10): 868-71.
10. Mittendorf R, Lain K.Y, Williams M.A, Walker C.K. Preeclampsia, a nested, case-control study of risk factors and their interactions. *J Reprod Med* 1996; 41(7): 491-6.
11. Moodley J, Gwababa S.S. S-nitrosothiol and S-nitrosoalbumin levels in preeclampsia plasma. *J Obstet Gynaecol* 2004; 24(7): 756-9.
12. Niromanesh S, Laghaii S, Mosavi-Jarrahi A. Supplementary calcium in prevention of preeclampsia. *Int J Gynecol Obstet* 2001; 74(1): 17-21.
13. Rodriguez J.G, Avendano R, Inzunza B. Hypoalciuria in pre-eclampsia. *Rev Chil Obstet Ginecol* 1993; 58(6): 470-4.
14. Salako B.L, Odukogbe A.T, Olayemi O, Adedapo K.S, Aimakhu C.O, Alu F.E, et al. Serum albumin, creatinine, uric acid and hypertensive disorders of pregnancy. *East Afr Med J* 2003; 80(8): 424-8.
15. Scott J.R, Disaia P.J, Hammond C.B, Spellacy W.N: Danforth's obstetrics & Gynecology, 8th ed., New York Lippincott, William and Wilkins, 1999; PP:237-47.
16. Siddiqui J.A, Rana I.A: Mineral and parathyroid hormone inter-relationships in normal pregnancy and

- pregnancy-induced hypertension. *J Pak Med Assoc* 1993; 43(5): 92-5.
17. Tyurin V.A, Liu S.X, Tyurina Y.Y, Sussman N.B, Hubel C.A, Roberts J.M, Taylor R.N, *et al.* Elevated levels of S-notrosoalbumin in preeclampsia plasma. *Circ Res* 2001; 88(11): 1210-5.
18. Vasiljevic N, Vasiljevic M, Plecas D. The role of Nutritional factors in pre-eclampsia and eclampsia. *Srp Arth Celok Lek* 1996; 124(5-6): 156-9.
19. Yang J.M, Wang K.G. Relationship between acute fetal distress and maternal-placental-fetal circulations in sever preeclampsia. *Acta Obstet Gynecol Scand* 1995; 74(6): 419-24.