

اپیدمیولوژی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گاوهاي شهرستان کرمان و تعين گونه و ژنوتایپ تعدادی از ايزولهها

رضافتوحی اردکانی^{*}، دکتر مجید فصیحی هرنده^۱، سهیل سلیمان بنایی^۲، حسین کامیابی^۳، دکتر منیزه عطاپور^۴، دکتر ایرج شریفی^۵

خلاصه

مقدمه: کریپتوسپوریدیوم یکی از مهم‌ترین بیماری‌های انگلی قابل انتقال بین انسان و دام است که در پستانداران شایع می‌باشد و تاکنون گونه‌های مختلفی از این تک‌یاخته گزارش شده است. این مطالعه با هدف شناسایی وضعیت اپیدمیولوژی عفونت کریپتوسپوریدیوم در گاوهاي شش منطقه شهرستان کرمان با روش‌های روتین مرفلوژیک و تعیین گونه و ژنوتایپ با روش‌های مولکولی انجام گرفت.

روش: نمونه مدفعه بطور مستقیم از رکتوم گاوها جمع‌آوری شد. آسیستهای کریپتوسپوریدیوم با روش تغییر فرمالین-اتر جدا و با رنگ آمیزی کائینیون اسید فست اصلاح شده رنگ آمیزی گردید. در تعدادی از ایزوله‌ها DNA با کیت QIAamp® استخراج و با پروتکل Nested PCR-RFLP بر روی ژن 18S rRNA قطعه حدود ۸۵۰ بازی تکثیر و با دو آنزیم محدود کننده SspI و VspI تعیین گونه و ژنوتایپ گردید. حداقل ۲۰ آسیست از هر ایزوله اندازه گیری شد.

یافته‌ها: از مجموع ۴۱۲ رأس گاو، ۷۸ مورد (۱۸/۹٪) آلوده به کریپتوسپوریدیوم بودند. آلودگی بر حسب قوام نمونه رابطه معنی‌داری نشان داد ($P=0.026$) بطوری که ۳۱/۸٪ گاوهاي اسهالی و ۱۷/۴٪ گاوهاي غیراسهالی آلوده بودند. سن با آلودگی ارتباط معنی‌دار داشت ($P=0.000$) بطوری که گوساله‌هاي شیرخوار زیر دو ماه با شیوع ۶/۳۳٪، بیشتر از سایر گروه‌ها آلوده بودند (۴۵/۱۳۴٪). در این مطالعه چهار ایزوله *C.andersoni* و هشت ایزوله *C.parvum* برای اولین بار در ایران با روش‌های مولکولی شناسایی شدند.

نتیجه گیری: کریپتوسپوریدیوم در گاوهاي مناطق مختلف شهرستان کرمان بهویژه گوساله‌هاي اسهالی شایع می‌باشد. به علاوه على رغم وجود *C.parvum* به عنوان گونه غالب همانند سایر کشورها، وجود *C.andersoni* برای اولین بار در ایران با روش‌های مولکولی تأیید می‌گردد. با توجه به خسارات اقتصادي ناشی از این آلودگی لزوم بررسی بیشتر از راه مولکولی در شناسایی آلودگی در سایر نقاط استان و ایران احساس می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: کریپتوسپوریدیوم، *C.andersoni* Nested PCR، شیوع، گاو، کرمان

۱- مری گروه انگل شناسی و مرکز تحقیقات لیشمایوز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان-۲- دانشیار گروه انگل شناسی و مرکز تحقیقات لیشمایوز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان-۳- کارشناس ارشد انگل شناسی، مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان-۴- کارشناس، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان-۵- دکترای علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-۶- استاد گروه انگل شناسی و مرکز تحقیقات لیشمایوز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

*نویسنده مسؤول، آدرس: گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی افضلی‌بور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان • آدرس پست الکترونیک: fotouhi@kmu.ac.ir

مقدمه

اولین بار در سال ۲۰۰۰ از *C.muris* تفکیک داده شد و به عنوان یک گونه آلدده کننده گاو معرفی شد. خصوصیات مرفولوژیک آن در مقایسه با *C.parvum* تا حدودی کمک به تشخیص آن می‌کند. به طوری که با اندازه ۵×۴/۵ میکرون در مقابل *C.andersoni* با اندازه ۷/۶×۵/۶ میکرون کوچک‌تر می‌باشد. تاکنون از کشورهای مختلف جهان گزارش شده است. گزارشات بیشتر از گاو و مواردی هم از گوسفند و شتر بوده است. *C.andersoni* عفونت‌زای شیردان گاو بوده و معمولاً باعث آلدگی گosalahهای از شیر گرفته شده و گاوهای جوان می‌شود. عفونت با این گونه می‌تواند متوسط تا شدید باشد و باعث کاهش وزن دام و کاهش شیر دادن به گosalah شده و تولید شیر را در گاوهای شیری کم می‌کند (۱،۲).

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در گاوهای شهرستان کرمان، برای اولین بار با روش‌های مورفلوژیک و مولکولی *C.andersoni* را در ایران گزارش می‌کند.

روش بررسی

این مطالعه یک بررسی مقطعی بوده و جامعه مورد مطالعه ۴۱۲ رأس گاو از ۶ منطقه مختلف شهرستان در سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۸۳ بوده است. برای نمونه‌گیری با مراجعه به هر منطقه نمونه مدفوع هر حیوان با دستکش معاینه برداشته و در ظروف در پیچ‌دار پلاستیکی نگهداری و به آزمایشگاه‌های پژوهشی گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی منتقل گردید. مشخصات هر دام شامل جنس و سن و قوام هر نمونه به صورت پرسشنامه پر گردید. نمونه مدفوع با روش تغليظ فرمالین-اتر تغليظ گردید سپس لام‌های تهيه شده با روش رنگ‌آمیزی کائینیون اسید فست تغییر یافته (زیلنلسون) رنگ‌آمیزی شد (۴). پس از رنگ‌آمیزی

کریپتوسپوریدیوزیس یکی از بیماری‌های تک‌یاخته‌ای بوده که عامل آن کوکسیدیایی از جنس کریپتوسپوریدیوم می‌باشد. کریپتوسپوریدیوم یکی از مهم‌ترین پاتوژن‌های شایع روده بوده و نقش زئوتوبیک آن باعث اهمیت آن از نظر پی‌آمدهای اقتصادی و بهداشتی در جوامع دامی و انسانی گردیده است. میزان شیوع در گاوهای از صفر تا ۷۰ درصد در مناطق مختلف دنیا گزارش شده است (۱،۲). مطالعات مختلف در ایران نشان داده که شیوع در گاوهای بسته به عوامل مختلف اپیدمیولوژیک بین ۴۲/۸ تا ۳/۸ درصد متغیر بوده است (۳-۵). کریپتوسپوریدیوزیس در ایران از گوسفند و بز نیز گزارش شده است (۶،۷). تاکنون یک مطالعه در مورد شیوع کریپتوسپوریدیوم در منطقه کرمان انجام شده که با توجه به سایر مناطق ایران شیوع بالایی را نشان می‌دهد (۵) و لزوم بررسی بیشتر در سایر نقاط شهرستان احساس می‌گردد.

به دلیل تفاوت‌های موجود بین گونه‌ها و ژنوتیپ‌های مختلف از نظر آلدگی، اپیدمیولوژی و مکانیسم‌های انتقال بیماری، شناسایی گونه و ژنوتیپ‌های کریپتوسپوریدیوم در هر منطقه جغرافیایی خاص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تا زمانی که گونه یا زیر‌گونه‌های کریپتوسپوریدیوم در هر منطقه شناسایی و تأیید نگردد، تشخیص اپیدمیولوژی و دامنه میزان ایزولهای بررسی شده فرضی و غیردقیق خواهد بود. از طرفی برای تعیین گونه و زیر‌گونه‌های کریپتوسپوریدیوم ناچار به استفاده از روش‌های مولکولی می‌باشد (۱،۲).

تاکنون ۱۶ گونه کریپتوسپوریدیوم از ۵ رده مهره‌داران گزارش گردیده که از این میان چهار گونه *C.parvum*, *C.felis* و ژنوتیپ *C.bovis*، *C.andersoni* و *C.bovis* گزارش شده است (۱). در ایران اخیراً برای اولین بار *C.parvum* در انسان و گاو گزارش شده است (۸،۹).

آنژیم VspI برای تعیین ژنوتیپ‌های *C.parvum* به کار می‌رود.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تست‌های آماری مربع کای و تست‌های ناپارامتریک مانند مان-ویتنی U و کروسکال-والیس H استفاده گردید. فاصله اطمینان ۹۵٪ و معیار معنی‌داری $P < 0.05$ تعیین گردید.

اُسیست‌های قرمز رنگ با عدسی ۴۰ پیدا و با عدسی ۱۰۰ تشخیص داده شد. برای هر اسلامی ۲۰ اُسیست توسط یک نفر متخصص ماهر با میکروسکوپ کالیبره اندازه‌گیری شد. اُسیست‌های جدا شده برای بررسی مولکولی در دی‌کرومات پتاسیم ۰.۲۵٪ در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد.

برای بررسی مولکولی اُسیست‌ها دوبار با آب مقطر شسته شدند تا دی‌کرومات پتاسیم آنها خارج گردد. سپس QiAmp Stool Mini Kit (Qiagen Inc, Mississauga, Ontario) کیت استخراج گردید. قبل از شروع مراحل استخراج برای پاره شدن دیواره اُسیست‌ها ۵ بار توسط نیتروژن مایع و آب جوش ذوب و انجامد گردید. سپس بر اساس پروتکل nested PCR ژن 18S rRNA کریپتوسپوریدیوم بر اساس رفرنس Jiang و همکاران تکثیر گردید (۱۱). در PCR اول یک قطعه ۱۳۲۵ بازی و در PCR دوم یک قطعه ۸۲۵ تا ۸۶۴ بازی تکثیر گردید. برای تعیین گونه و ژنوتیپ ایزوله‌ها با روش RFLP PCR دوم با آنزیم‌های SspI و VspI طبق پروتکل رفرنس و سازنده آنزیم هضم گردید (۱۱). آنزیم SspI تعیین گونه‌های کریپتوسپوریدیوم و

نتایج

از ۴۱۲ گاو مورد بررسی در مناطق مختلف کرمان در ۷۸ مورد ($P = 0.05$; CI = ۰.۱۵-۰.۲۲) اُسیست کریپتوسپوریدیوم مشاهده گردید (جدول ۱). از ۴۴ نمونه اسهالی ۱۴ مورد (۰.۳۱٪) و از ۳۶۸ نمونه غیراسهالی ۶۴ مورد (۰.۱۷٪) آلوده به کریپتوسپوریدیوم بوده که اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد ($P = 0.026$). همچین میزان شیوع انگل بر حسب میانگین سن نشان می‌دهد که شیوع در گوساله‌های سنین پایین به طور معنی‌داری بیشتر از گروه‌های سنی بالا می‌باشد ($P = 0.000$). به طوری که شیوع در گوساله‌های زیر دو ماه ۳۳٪ می‌باشد (جدول یک). نتایج نشان می‌دهد که آلدگی بین گاوهای نر و ماده اختلاف معنی‌داری ندارد.

جدول ۱: فراوانی میزان عفونت کریپتوسپوریدیوم در گاوهای شهرستان کرمان

بر حسب اطلاعات اپیدمیولوژیک

متغیر	فرابویژه				P.value
	تعداد (درصد)	مشتبه	منفی	جمع	
نر	(۲۱/۲)۱۸	(۷۸/۸)۶۷	(۷۸/۸)۶۷	(۲۰/۶)۸۵	۰.۵۳۸
ماده	(۱۸/۳)۶۰	(۸۱/۷)۲۷	(۸۱/۷)۲۷	(۷۹/۴)۳۷	
زیر ۲ ماه	(۳۳/۶)۴۵	(۶۶/۴)۸۹	(۶۶/۴)۸۹	(۳۲/۵)۱۳۴	۰.۰۰۰
سن	(۱۱)۲۳	(۸۹)۱۸۶	(۸۹)۱۸۶	(۵۰/۷)۲۰۹	
بالای ۱۲ ماه	(۱۴/۵)۱۰	(۸۵/۵)۵۹	(۸۵/۵)۵۹	(۱۶/۷)۶۹	
اسهالی	(۳۱/۸)۱۴	(۶۸/۲)۳۰	(۶۸/۲)۳۰	(۱۰/۷)۴۴	۰.۰۲۶
قوام	(۱۷/۴)۶۴	(۸۲/۶)۳۰۴	(۸۲/۶)۳۰۴	(۸۹/۳)۳۸	
جمع	(۱۸/۹)۷۸	(۸۱/۱)۳۳۴	(۸۱/۱)۳۳۴	(۱۰/۰)۴۱۲	

بزرگتر *C.andersoni* میباشد (شکل ۲-الف و ب). همچنین بررسی مولکولی هشت ایزوبله با اندازه 4×6 میکرون *C.parvum* را نشان داد. اطلاعات اپیدمیولوژیک دوازده ایزوبله که با بررسی مولکولی تعیین گونه و ژنوتیپ گردیدند در جدول ۲ نشان داده شده است.


در تمام ۷۸ اسلاید آسیستها اندازه گیری شد و متوسط اندازه اکثر آسیستها 4×6 میکرون بود (شکل ۱-الف). آسیستهای ۶ ایزوبله با متوسط اندازه $5/5 \times 7/5$ میکرون (شکل ۱-ب) بزرگتر بودند. بررسی مولکولی با روش nested PCR-RFLP نشان داد که چهار ایزوبله با آسیستهای

جدول ۲: اطلاعات اپیدمیولوژیک گونه‌های کربتوسپوریدیوم جاذبه‌ای از گاو‌های شهرستان کرمان با روش ۱۸S rRNA شناسایی شاهد براساس ژن nested PCR-RFLP

گونه کربتوسپوریدیوم	اندازه آسیست (میکرون)	قوام نمونه	گروه سنی	جنس	ایزوبله
<i>C.parvum</i>	$4 \times 5/5$	غیراسهالی	۱	ماده	۱
<i>C.parvum</i>	4×6	اسهالی	۲	ماده	۲
<i>C.parvum</i>	4×6	اسهالی	۲	ماده	۳
<i>C.parvum</i>	4×6	غیراسهالی	۱	نر	۴
<i>C.parvum</i>	4×6	غیراسهالی	۱	ماده	۵
<i>C.parvum</i>	4×6	غیراسهالی	۱	ماده	۶
<i>C.parvum</i>	4×6	غیراسهالی	۱	ماده	۷
<i>C.parvum</i>	4×6	غیراسهالی	۱	نر	۸
<i>C.andersoni</i>	6×8	غیراسهالی	۲	ماده	۹
<i>C.andersoni</i>	6×8	غیراسهالی	۳	ماده	۱۰
<i>C.andersoni</i>	$6 \times 7/5$	اسهالی	۲	ماده	۱۱
<i>C.andersoni</i>	$6 \times 7/5$	غیراسهالی	۲	ماده	۱۲



ب




الف

شکل ۱: آسیستهای ترمز کربتوسپوریدیوم با رنگ آمیزی کائینیون اسید فست تغییر یافته با اندازه‌های متفاوت (بزرگنمایی ۱۰۰۰)

الف: متوسط اندازه آسیست 4×6 میکرون که در محدوده اندازه *C.parvum* میباشد.

ب: آسیستهای با متوسط اندازه $5/5 \times 7/5$ میکرون که بزرگتر و یوضی تراز شکل الف بوده و در محدوده اندازه *C.andersoni* میباشد.



شکل ۲: تعیین گونه و ژنتوتیپ اینوله‌های کریپتوسپوریدیوم از گاوهاي شهرستان کرمان با روش nested PCR-RFLP با ژن 18S rRNA

الف: هضم محصول PCR دوم با آنزیم *SspI* ستون شماره یک، *C.parvum* (بند های ۴۴۹، ۴۴۶ و ۲۵۴ بازی); ستون شماره ۲ تا ۴ (*C.andersoni* بند های ۳۸۵ و ۳۸۷ بازی).

ب: ستون شماره ۱ تا ۴، هضم محصول PCR دوم با آنزیم *VspI*؛ ستون شماره یک، *C.parvum* (بند های ۱۰۴ و ۶۲۵ بازی); ستون شماره ۲ تا ۴ (*C.andersoni* بند های ۱۰۲ و ۷۳۱ بازی).

ستون شماره ۵ و ۶، بند حدود ۸۵۰ بازی حاصل از محصول PCR دوم، مارکر اندازه DNA بر اساس ۱۰۰ بازی.

مي گيرند و بايستي تدابير بهداشتی و مدیريت نگهداري در دامهاي جوان تر بهتر اعمال شود (۳،۵،۱۲).

در مقاييسه ميزان آلدگي بر حسب قوام نمونه رابطه معني داري مشاهده شد به طوري كه ميزان آلدگي در گاوهاي اسهالي حدود دو برابر ييشتر بود. اين تفاوت در ساير مطالعات هم به چشم مي خورد و نشان دهنده اين است كه کريپتوسپوريدیوم خود يكى از عوامل مهم مولد اسهال مي باشد و مي تواند باعث ضررهای اقتصادي فراوانی شود (۱۰،۱۲). همچنين در اين مطالعه شيوع عفونت در گوساله‌های اسهالی ۳۵/۷٪ بود که نشان دهنده بالا بودن ميزان عفونت در گوساله‌های اسهالی با سن پاين است.

در ايران تاکنون *C.parvum* از انسان و گاو با روش‌های مولکولی گزارش شده است (۸،۹) و مطالعه حاضر نيز وجود *C.parvum* در گاوهاي شهرستان کرمان را با روش‌های مولکولی و مورفو‌لوزيکي تأييد مي کند. گونه زئونوز و آلدده کننده پستانداران است که تاکنون

بحث

آلدگي به کريپتوسپوريدیوم در کرمان، در کودکان اسهالي ۴/۱٪، در بزرگ ۱۷/۶٪، در گوسفنده ۱۳/۸٪ و در گوساله ۲۱/۶٪ گزارش گردیده است (۵). بررسی حاضر نشان داد که کريپتوسپوريدیوزیس در گاوهاي شهرستان کرمان شيوع بالايی دارد. هرچند ميزان آلدگي ۱۸/۹ درصدی در اين مطالعه نسبت به بررسی رادفر و همكاران (۵) در کرمان كمتر مي باشد ولی در مقاييسه با بررسی اعظمی در اصفهان (۳) خيلي بالاتر بوده که اين مسئله مي تواند به دليل تفاوت در شرایط نگهداري دام، مدیريت بهداشتی گاوداريها و تفاوت در شرایط آب و هواي باشد.

در اين بررسی شيوع عفونت بر حسب سن اختلاف معني داري نشان داد که با ساير مطالعات مطابقت دارد. اين مسئله نشان مي دهد که گوساله‌های جوان نسبت به گاوهاي بالغ حساس تر بوده و ييشتر در معرض آلدگي قرار

کریپتوسپوریدیوم شبه موریس در گاو، گاویمیش و شتر توسط نوری و همکاران از مناطق مختلف ایران گزارش شده است (۱۳). همچنین *C.andersoni* از سایر مناطق دنیا مانند ویتنام (۰.۵/۶٪)، ژاپن (۰.۱/۵٪) و انگلستان (۰.۱۶٪) گزارش شده است (۱۰). بررسی مولکولی نشان می‌دهد که *C.parvum* همچون *C.andersoni* در دام‌های شهرستان شایع می‌باشد. همه نمونه‌های تأیید شده *C.andersoni* در گروه سنی ۲ تا ۱۲ ماه و بالای ۱۲ ماه بوده در حالی که نمونه‌های *C.parvum* بیشتر در گروه سنی زیر ۲ ماه مشاهده گردید که با سایر مطالعات همخوانی دارد (۱۰).

با توجه به خسارت اقتصادی زیادی که در نتیجه آلوودگی با این گونه برای دامداران ایجاد می‌گردد لزوم بررسی بیشتر مولکولی در تشخیص آلوودگی در سایر نقاط استان و ایران احساس می‌گردد.

سپاسگزاری

این مطالعه با بخشی از هزینه طرح شماره ۸۳/۰۱ معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گردیده است. بدین‌وسیله از مسؤولین آن معاونت تشکر و قدردانی می‌گردد.

تعداد زیادی میزبان برای آن گزارش شده است. این گونه دارای ژنوتیپ‌های مختلفی در چندین میزبان می‌باشد که نقش آلووده کنندگی آن برای سایر میزبان‌ها جای سؤال دارد. بررسی‌های مولکولی و تعیین گونه و ژنوتیپ‌های کریپتوسپوریدیوم به شناسایی منع آلوودگی و اختصاصیت میزبان و نقش آنها در آلوودگی سایر میزبان‌ها کمک می‌کند و باعث جلوگیری از سردرگمی اپیدمیولوژیست‌ها در کنترل و پیشگیری از عفونت می‌گردد (۲).

تاکنون دو گونه شایع از جنس کریپتوسپوریدیوم در گاو شناسایی شده است. این دو گونه *C.parvum* که عفونت‌زای روده کوچک بوده و *C.andersoni* که عفونت‌زای شیردان است، می‌باشند و از نظر اندازه اُسیست تا حدودی قابل تفکیک هستند. *C.parvum* شیوع بیشتری داشته و بیشتر با اسهال در دام‌های شیرخوار همراه است. بیشترین عفونت در دام‌های ۱-۳ هفت‌های می‌باشد. *C.andersoni* شیوع کمتری داشته و در گوساله‌های بالغ و جوان دیده می‌شود که شیوع آن همراه با کاهش وزن و فرآورده‌های شیری می‌باشد (۱).

در بررسی حاضر برای اولین بار در ایران وجود *C.andersoni* در گاو به اثبات رسید. قبلًاً شواهدی از وجود

Epidemiology of Cryptosporidium Infection of Cattle in Kerman/Iran and Molecular Genotyping of some Isolates

Fotouhi Ardakani R., M.Sc.^{1*}, Fasihi Harandi, M., Ph.D.², Solayman Banai S., M.Sc.³, Kamyabi H., B.Sc.⁴, Atapour M., D.C.L.⁵, Sharifi I., Ph.D.⁶

1. Instructor, Parasitology Department and Leishmaniasis Research Center, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2. Associate Professor, Parasitology Department and Leishmaniasis Research Center, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3. Master of Science in Parasitology, Isfahan Health Center 2, Isfahan, Iran

4. Bachelor of Science in Parasitology, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

5. Professional Doctor in Clinical Laboratory Sciences, Neuroscience Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

6. Professor of Parasitology, Parasitology Department and Leishmaniasis Research Center, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

* Corresponding author, e-mail: fotouhi@kmu.ac.ir

(Received 7 Dec. 2007 Accepted 11 June 2008)

Abstract

Background & Aims: Cryptosporidiosis is one of the most important parasitic zoonoses of human and animals. This infection is common in mammals and caused by the coccidian parasites of the genus *Cryptosporidium*. The Present study was designed to determine the epidemiology of *Cryptosporidium* infection in cattle in Kerman by using conventional morphological as well as molecular methods for molecular characterization.

Methods: Fecal samples of cattle were collected fresh and directly from the rectum. *Cryptosporidium* oocysts were isolated by using formalin-ether sedimentation method followed by modified Ziehl-Neelsen staining technique. DNA of a number of isolates was extracted using QIAamp[®] DNA stool mini kit (Qiagen[®]). A nested PCR-RFLP protocol amplifying ~ 850 bp fragment of SSU-rRNA gene used to differentiate species and genotypes of the isolates, using SspI and VspI as two restriction endonucleases. For each slide at least 20 oocysts were measured.

Results: Seventy eight of 412 cattle (18.9%) were found to be infected. *Cryptosporidium* infection was associated with diarrhea ($P=0.026$) in a way that 31.8% of diarrheic cattle (14.44) and 17.4% of non diarrheic cattle (64.368) were infected. The rate of infection in suckling calves <2 months age was significantly higher than others (45.134 vs. 33.6%, $P=0.000$). In this study 4 isolates of *C. andersoni* and 8 isolates of *C. parvum* were found for the first time in Iran by using molecular techniques.

Conclusion: *Cryptosporidium* infection is common in cattle of Kerman. Moreover, in spite of the presence of *C.parvum* as the dominant species in Iran, the presence of *C.andersoni* in Iran is reported for the first time by molecular techniques. Economic and public health problems resulted from infection by *C.andersoni* require more investigations in other parts of Kerman province and Iran.

Keywords: *Cryptosporidium*, Nested PCR, *C.andersoni*, Prevalence, Cattle, Kerman

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2008; 15(4): 313-320

References

1. Upton S.J. *Cryptosporidium*: they probably taste like chicken. In: Thompson R C A, Armson A, Ryan U M. (editors), *Cryptosporidium*: from Molecules to Disease. Elsevier, Amsterdam, the Netherlands. 2003; pp 3-10.
2. Xiao L, Fayer R, Ryan U, Upton SJ. *Cryptosporidium* Taxonomy: recent advances and implications for public health. *Clin Microbiol Rev* 2004; 17(1): 72-97.
3. Azami M. Prevalence of *Cryptosporidium* infection in cattle in Isfahan, Iran. *J Eukaryot Microbiol* 2007; 54(1):100-2.
4. Henriksen SA, Pohlenz JF. Staining of Cryptosporidia by a modified Ziehl-Neelsen technique. *Acta Vet Scand* 1981; 22(3-4):594-6.
5. Radfar MH, Molaei MM, Baghbannejad A. Prevalence of *Cryptosporidium* spp. Oocysts in dairy calves in Kerman, southeastern Iran. *Iranian Journal of Veterinary Research, University of Shiraz*. 2006; 7(2):81-4.
6. Fasihi Harandi M, Fotouhi Ardakani R. *Cryptosporidium* infection of sheep and goats in kerman: epidemiology and risk factor analysis. *J Vet. Res.* 2008; 63(1): 47-51.
7. Nouri M, Mahdavi Rad S. Effect of nomadic shepherds and their sheep on the incidence of cryptosporidiosis in an adjacent town. *J Infect* 1993; 26(1):105-6.
8. Fasihi Harandi M, Fotouhi Ardakani R. *Cryptosporidium* infection of farm animals: first identification of *Cryptosporidium andersoni* and *Cryptosporidium parvum* in Iran. 11th International Congress of Parasitology; 2006 Aug 6-11, Glasgow, Scotland.
9. Meamar AR, Guyot K, Certad G, Dei-Cas E, Mohraz M, Mohebali M, et al. Molecular characterization of *Cryptosporidium* isolates from humans and animals in Iran. *Appl Environ Microbiol* 2007; 73(3):1033-5.
10. Nguyen ST, Nguyen DT, Le DQ, Le Hua LN, Van Nguyen T, Honma H, et al. Prevalence and first genetic identification of *Cryptosporidium* spp. In cattle in central Viet Nam. *Vet Parasitol* 2007; 150(4): 357-61.
11. Jiang J, Alderisio KA, Xiao L. Distribution of *Cryptosporidium* genotypes in storm event water samples from three watersheds in New York. *Appl Environ Microbiol* 2005; 71(8):4446-54
12. Nouri M, Toroghi R. Asymptomatic cryptosporidiosis in cattle and humans in Iran. *Vet Rec* 1991; 128(15): 358-9.
13. Nouri M. A cryptosporidium muris-like parasite in cattle and camels in Iran. *Indian Veterinary Journal* 2002; 50, 1-5.