

بررسی عوامل باکتریایی ماستیت در زنان شیرده و تعیین الگوی حساسیت آنها در بیمارستان میرزاکوچک خان تهران به مدت یک سال (۱۳۸۲-۸۳)

دکتر کیومرث قاضی سعیدی^{*}، دکتر فرجحدخت فاطمی نسب^آ، شیده وطنی^آ، مریم محمدی^آ و دکتر عزت الله قائمی^آ

خلاصه

مقدمه: ماستیت به التهاب پستان گفته می‌شود و معمولاً در دوران شیردهی ایجاد می‌شود به همین دلیل معمولاً به عنوان ماستیت دوران شیردهی (Lactational mastitis) نامیده می‌شود. عوامل اصلی ایجاد ماستیت توقف جریان شیر و عفونت می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ماستیت در زنان شیرده و تشخیص عفونت باکتریایی مرتبط با آن و تعیین الگوی حساسیت دارویی این باکتری‌ها می‌باشد.

روش: این مطالعه به مدت یکسال (۱۳۸۲-۸۳) بر روی ۲۰۳ مادر تازه وضع حمل کرده مراجعه کننده به بیمارستان میرزاکوچک خان تهران با عالیم بالینی ماستیت انجام شد. نمونه شیر این زنان با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و کشت بررسی شدند. پس از تعیین هویت باکتری‌های جدا شده با استفاده از روش‌های بیوشیمیایی، آزمون‌های تعیین حساسیت بر روی این باکتری‌ها به روش دیسک دیفیوژن (Kirby & Baur) انجام شد.

یافته‌ها: از مجموع ۲۰۳ نمونه، ۵۶ نمونه (۲۷/۶٪) کشت مثبت و ۱۴۷ نمونه (۷۲/۴٪) کشت منفی بودند. از ۵۶ نمونه کشت مثبت ۵۱ نمونه (۹۱/۱٪) از نظر وجود استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی و ۵ نمونه (۸/۹٪) از نظر وجود استافیلوکوک‌اورئوس مثبت شدند. از ۵۱ نمونه مثبت از نظر وجود استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی، ۲۱ نمونه دارای کلنی بیش از ۱۰^۳ در هر میلی لیتر شیر بودند. استافیلوکوک‌اورئوس جدا شده از هر ۵ نمونه همچنین استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی جدا شده از هر ۲۱ نمونه نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های فلوكساسیلین، دیکلوكساسیلین، کلوكساسیلین حساس بودند.

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان‌دهنده نقش استافیلوکوک‌اورئوس و سایر استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی در ایجاد ماستیت عفونی می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: ماستیت، استافیلوکوک‌اورئوس، استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی

۱- استاد گروه میکروب شناسی و ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان-۲- استادیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران-۳- کارشناس ارشد میکروب شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران-۴- دانشیار گروه میکروب شناسی و ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان

*نویسنده مسؤول: گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان • آدرس پست الکترونیک: Kiumars ghazisaidi@yahoo.com

دریافت مقاله: ۱۳۸۵/۲/۲۰ دریافت مقاله اصلاح شده: ۱۳۸۵/۹/۲۲ پذیرش مقاله: ۱۳۸۵/۱۰/۱۳

و سخت شده (۶) و علایم التهاب موضعی و کاهش در شیر مشاهده می شود (۱۲). ممکن است علایم عمومی از جمله تب ۳۸/۵°C یا بیشتر، بی حالی و لرز دیده شود (۷). اما تشخیص ماستیت عفونی از غیر عفونی از طریق علایم بالینی امکان پذیر نمی باشد. در صورت امکان، کشت نمونه شیر برای تعیین عوامل عفونی توصیه می گردد (۷). نمونه ای با بیش از ۱۰^۳ لکوسیت و بیش از ۱۰^۳ باکتری در هر میلی لیتر شیر نشان دهنده ماستیت عفونی است (۱۵).

ماستیت به دو دلیل اهمیت دارد. اولًاً عامل کاهش تولید شیر بوده و تقریباً ۴٪ مادران به دلیل ماستیت از شیر دادن به نوزاد خود اجتناب می کنند (۴،۱۲). قطع شیر مادر سلامت نوزاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد (۵). ثانیًاً ماستیت خطر انتقال عفونت از مادر به نوزاد را افزایش می دهد (۱۱). در مورد رتروویروس ها خطر انتقال تا ۲-۴ برابر افزایش می یابد (۱۶).

با توجه به اهمیت ماستیت در سلامت نوزادان لازم است که زنان با علایم ماستیت در دوران شیردهی به سرعت شناسایی و درمان شوند. طبق گزارش WHO در موارد ماستیت عفونی بهتر است برای انتخاب آنتی بیوتیک مناسب نمونه شیر کشت داده شده و حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ها تعیین شود (۱۵). هدف از انجام این مطالعه بررسی ماستیت در زنان شیرده و تشخیص عفونت باکتریایی مرتبط با آن و تعیین الگوی حساسیت دارویی این باکتری ها می باشد.

روش بررسی

این مطالعه در مدت یک سال (۱۳۸۲-۸۳) بر روی ۲۰۳ نمونه شیر مادران تازه وضع حمل کرده مراجعت کننده به بیمارستان میرزا کوچک خان تهران انجام شد. علایم بالینی ماستیت در تمام مادران توسط پزشک تأیید شده بود. برای گرفتن نمونه شیر از مادران درخواست می شد پس از شستشوی پستان با آب گرم و شستشوی دستها با صابون چند قطره اول شیر خودرا پاک کرده و سپس ۵cc از شیر داخل لوله های استریل جمع آوری می گردید. نمونه ها

مقدمه

ماستیت به التهاب پستان گفته شده که معمولاً در دوران شیردهی روی می دهد و به همین دلیل معمولاً به نام ماستیت دوران شیردهی (Lactational mastitis) نامیده می شود (۳).

ماستیت معمولاً در هفته های دوم و یا سوم پس از زایمان رخ می دهد (۷). اکثر گزارشات نشان می دهد که ۷۴ تا ۹۵٪ از موارد ماستیت در ۱۲ هفته اول پس از زایمان (۱۳) و به ندرت پس از هفته دوازدهم دیده می شود (۷).

ماستیت نسبتاً شایع بوده و ۵-۳۳ درصد از زنان در دوران شیردهی به آن مبتلا می شوند (۱۲). عوامل اصلی ایجاد ماستیت توقف جریان شیر (Milk stasis) و عفونت می باشد. توقف جریان شیر زمانی رخ می دهد که شیر در زمان شیردهی به طور کامل خارج نشود. وضعیت نامناسب در آغوش گرفتن نوزاد هنگام شیردهی، عدم توانایی کافی نوزاد در مکیدن شیر، محدود بودن دفعات و مدت زمان شیردهی و انسداد مجرأ و کانال های شیردهی می تواند منجر به توقف جریان شیر گردد (۵). در نتیجه تجمع شیر، شرایط مناسبی برای رشد باکتری ها فراهم می گردد. شایع ترین ارگانیسم هایی که در ماستیت یافت می شوند استافیلو کوک اورئوس و استافیلو کوک های کوآگولاز منفی می باشند (۶،۷). در تحقیق Aabo و همکارانش استافیلو کوک اورئوس از نمونه شیر زنان تازه وضع حمل کرده مبتلا به ماستیت با فراوانی بیشتری نسبت به زنان سالم جدا شد (۱). گونه های استرپتو کوک، باسیل های گرم منفی از جمله اشريشيا كولي گاهی اوقات یافت شده (۶،۷) و بندرت گونه های سالمونلا، مايكوباكتریوم، کاندیدا و کرپیتو کوکوس نیز جدا شده اند (۱۲).

از جمله راه های ورود ارگانیسم که توسط محققان پیشنهاد شده می توان به ورود ارگانیسم از طریق کانال های حمل کننده شیر به لوب، از طریق شکاف ها و ترک خورده گی های نوک پستان و انتشار از طریق خون، اشاره کرد (۶،۹).

تشخیص ماستیت معمولاً براساس علایم بالینی می باشد (۱۲). معمولاً یکی از پستان ها قرمز، دردناک، متورم

سنجدیده شد. دیسک‌های آنتی‌بیوتیک از تولیدات شرکت Himedia بودند.

نتایج

از مجموع ۲۰۳ نمونه، ۵۶ نمونه (۲۷/۶٪) کشت مثبت و ۱۴۷ نمونه (۷۲/۴٪) کشت منفی بودند. از ۵۶ نمونه کشت مثبت ۵۱ نمونه (۹۱/۱٪) از نظر وجود استافیلوكوک‌های کواگولاز منفی و ۵ نمونه (۸/۹٪) از نظر وجود استافیلوكوک‌اورثوس مثبت شدند. تعداد باکتری‌های استافیلوكوک‌اورثوس جدا شده بیش از 10^3 در هر میلی‌لیتر شیر بودند. اما در مورد استافیلوكوک‌های کواگولاز منفی از ۵۱ نمونه کشت مثبت، ۲۱ نمونه دارای کلنجی بیش از 10^3 در هر میلی‌لیتر شیر بود و در ۳۰ نمونه تعداد کلنجی‌ها کمتر از 10^3 در هر میلی‌لیتر بود.

حساسیت و مقاومت استافیلوكوک‌اورثوس‌های جدا شده از ۵ نمونه نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف در جدول ۱ نشان داده شده است. استافیلوكوک اورثوس جدا شده از هر ۵ نمونه نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های فلوکساسیلین، دیکلوكساسیلین، کلوكساسیلین حساس بودند. از ۵ نمونه، ۲ نمونه به آموکسیسیلین، ۳ نمونه به تتراسایکلین، ۳ نمونه به اریترو‌مایسین، ۳ نمونه به ازیترو‌مایسین، ۲ نمونه به سفالوتین و ۱ نمونه به کوتريموکسازول حساس بودند. توزیع فراوانی مطلق و نسبی استافیلوكوک اورثوس‌های جدا شده بر حسب مقاومت و حساسیت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف در جدول ۲ نشان داده شده است.

بلافاصله برای کشت و بررسی میکروبی به آزمایشگاه منتقل می‌شد. نمونه‌ها به محیط (B.A) Blood Agar (B.A) تلقیح شده و به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور 37°C قرار می‌گرفتند. پس از رشد باکتری‌ها برروی محیط کشت از کلنجی‌ها لام مستقیم تهیه شده و برای تشخیص باکتری‌ها تست‌های افتراقی زیر انجام می‌شد.

تست کاتالاز (آب اکسیژنه ۳٪)، کواگولاز [پلاسمای سیتراته خرگوش به نسبت $\frac{1}{4}$ (۱۰۰ پلاسما، ۴۰۰ سرم فیزیولوژی استریل) تهیه شده سپس سوسپانسیون غلیظی از باکتری تهیه و به مدت ۲ الی ۴ ساعت در انکوباتور 37°C قرار داده می‌شد. در صورت بسته شدن پس از این مدت، نتیجه مثبت در نظر گرفته می‌شد] و تخمیر مانیتول (۸). پس از تعیین هویت باکتری‌ها با استفاده از روش‌های بیوشیمیایی، آزمون‌های تعیین حساسیت بر روی باکتری‌های جدا شده به روش دیسک دیفیوژن (Kirby & Baur) و بر روی محیط مولرهیتون آگار انجام شد.

سوسپانسیون باکتری معادل ۰/۵ مک فارلند در سرم فیزیولوژی تهیه شده و سپس با استفاده از سواب در محیط مولرهیتون آگار کشت داده شده و سپس دیسک‌های آنتی‌بیوتیک با فواصل مناسب روی محیط قرار می‌گرفت (۲).

حساسیت باکتری‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های آموکسیسیلین، تتراسایکلین، اریترو‌مایسین، ازیترو‌مایسین، فلوکساسیلین، دیکلوكساسیلین، کلوكساسیلین و سفالوتین

جدول ۱: حساسیت و مقاومت ۵ نمونه مثبت استافیلوكوک اورثوس جدا شده از بیماران مورد مطالعه نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف

نوع آنتی‌بیوتیک نمونه									
کوتريموکسازول	سفالوتین	کلوكساسیلین	دیکلوكساسیلین	فلوکساسیلین	ازیترو‌مایسین	ترراسایکلین	اریترو‌مایسین	آموکسیسیلین	
R	S	S	S	S	S	S	S	R	۱
R	R	S	S	S	R	R	S	R	۲
S	R	S	S	S	S	S	R	S	۳
R	S	S	S	S	R	R	S	R	۴
R	R	S	S	S	S	S	R	S	۵

R = مقاوم S = حساس

جدول ۲: توزیع فراوانی مطلق و نسبی استافیلوکوک اورئوس‌های جدا شده بر حسب مقاومت و حساسیت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف

جمع		حساس		مقاوم		حساسیت نمونه
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۱۰۰	۵	۴۰	۲	۶۰	۳	آموکسی‌سیلین
۱۰۰	۵	۶۰	۳	۴۰	۲	تراسایکلین
۱۰۰	۵	۶۰	۳	۴۰	۲	اریترومایسین
۱۰۰	۵	۶۰	۳	۴۰	۲	آزترومایسین
۱۰۰	۵	۱۰۰	۵	۰	۰	فلوکساسیلین
۱۰۰	۵	۱۰۰	۵	۰	۰	دیکلوكساسیلین
۱۰۰	۵	۱۰۰	۵	۰	۰	کلوكساسیلین
۱۰۰	۵	۴۰	۲	۶۰	۳	سفالوتین
۱۰۰	۵	۲۰	۱	۸۰	۴	کوتزیموکسازول

جدول ۳: حساسیت و مقاومت ۲۱ نمونه استافیلوکوک کوآگلاز منفی جدا شده از بیماران نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف

نمونه	آنتی‌بیوتیک	نوع آنتی‌بیوتیک								
		کوتزیموکسازول	سفالوتین	کلوكساسیلین	دیکلوكساسیلین	فلوکساسیلین	آزترومایسین	اریترومایسین	تراسایکلین	آموکسی‌سیلین
R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	۱
S	S	S	S	S	S	S	R	R	R	۲
S	S	S	S	S	R	R	R	S	S	۳
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	۴
S	S	S	S	S	R	R	R	S	S	۵
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	۶
R	R	S	S	S	S	S	S	S	R	۷
R	S	S	S	S	S	R	R	R	S	۸
R	R	S	S	S	S	S	S	S	S	۹
R	R	S	S	S	S	S	S	S	R	۱۰
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	۱۱
S	S	S	S	S	S	S	S	S	R	۱۲
R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	۱۳
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	۱۴
S	S	S	S	S	S	R	R	S	S	۱۵
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	۱۶
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	۱۷
R	S	S	S	S	S	S	S	S	R	۱۸
R	S	S	S	S	S	S	S	R	R	۱۹
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	۲۰
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	۲۱

جدول ۴ توزیع فراوانی مطلق و نسبی استافیلوکوک‌های کوآگولاز منفی جدا شده بر حسب مقاومت و حساسیت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف

جمع		حساس		مقاوم		نمونه	حساسیت
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۱۰۰	۲۱	۷۱/۴	۱۵	۲۸۶	۶	آموکسی‌سیلین	
۱۰۰	۲۱	۷۷/۲	۱۶	۲۳۸	۵	تراسایکلین	
۱۰۰	۲۱	۸۱	۱۷	۱۹	۴	اریترو‌ماپیسین	
۱۰۰	۲۱	۸۱	۱۷	۱۹	۴	آزیترو‌ماپیسین	
۱۰۰	۲۱	۱۰۰	۲۱	۰	۰	فلوکسازیلین	
۱۰۰	۲۱	۱۰۰	۲۱	۰	۰	دیکلوكسازیلین	
۱۰۰	۲۱	۱۰۰	۲۱	۰	۰	کلوکسازیلین	
۱۰۰	۲۱	۸۰/۷	۱۸	۱۴۳	۳	سفالوتین	
۱۰۰	۲۱	۶۱/۹	۱۳	۳۸۱	۸	کوتزیموکسازول	

استافیلوکوک اورئوس جدا شد. در تحقیق Aabo و همکارانش (۱) و Matheson (۱۰) استافیلوکوک اورئوس از نمونه شیر زنان تازه وضع حمل کرده مبتلا به ماستیت با فراوانی بیشتری نسبت به زنان سالم جدا شد. در مطالعه Aabo و همکارانش که به مدت ۲۲ ماه بر روی زنان تازه وضع حمل کرده انجام شد، استافیلوکوک اورئوس با فراوانی بیشتری از نمونه شیر به دست آمده از پستان با عالیمی بالینی ماستیت نسبت به نمونه شیر گرفته شده از پستان بدون علامت و همچنین نمونه شیر افراد سالم جدا شد (به ترتیب ۱۷/۴، ۱۴/۴، ۱۰/۴٪) (۱). در گزارشات متعدد محققان از استافیلوکوک اورئوس و استافیلوکوک‌های کوآگولاز منفی به عنوان شایع‌ترین عوامل ماستیت نام می‌برند (۷، ۶٪). در مطالعه حاضر نیز از ۵۶ نمونه کشت مثبت، از ۵ نمونه استافیلوکوک اورئوس و از ۵۱ نمونه (۹۱/۱٪) استافیلوکوک‌های کوآگولاز منفی جدا شد. مطالعات انجام شده توسط محققان نشان می‌دهد که از نمونه شیر مادران بدون عالیم بالینی ماستیت نیز می‌توان باکتری جدا کرد ولی طیف این باکتری‌های جدا شده معمولاً بسیار مشابه به باکتری‌های موجود بر سطح پوست می‌باشد (۱۵). لذا باید تاحد امکان از آلودگی نمونه‌ها با باکتری‌های سطح پوست جلوگیری شود. در این مطالعه سعی شد تا شرایط مناسبی در حین نمونه‌گیری

حساسیت و مقاومت استافیلوکوک‌های کوآگولاز منفی جدا شده از ۲۱ نمونه که دارای کلنی بیش از 10^3 در هر میلی‌لیتر شیر بودند، نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف در جدول ۳ نشان داده شده است. استافیلوکوک‌های کوآگولاز منفی جدا شده از هر ۲۱ نمونه نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های فلوکسازیلین، دیکلوكسازیلین، کلوکسازیلین حساس بودند. از ۲۱ نمونه، ۱۵ نمونه به آموکسی‌سیلین، ۱۶ نمونه به تراسایکلین، ۱۷ نمونه به اریترو‌ماپیسین، ۱۷ نمونه به آزیترو‌ماپیسین، ۱۸ نمونه به سفالوتین و ۱۳ نمونه به کوتزیموکسازول حساس بودند. جدول ۴ توزیع فراوانی مطلق و نسبی استافیلوکوک‌های کوآگولاز منفی جدا شده را بر حسب مقاومت و حساسیت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف نشان می‌دهد.

بحث

ماستیت به التهاب پستان گفته شده و معمولاً در دوران شیردهی رخ می‌دهد. توقف جريان شیر به دلایل مختلف منجر به تجمع شیر می‌گردد. بدین ترتیب شرایط مناسبی برای رشد باکتری‌ها فراهم می‌شود.

در این مطالعه از ۲۰۳ نمونه شیر به دست آمده از مادران تازه وضع حمل کرده با عالیم ماستیت، در ۵۶ نمونه (۲۷/۶٪) کشت مثبت بود. از ۵ نمونه (۸/۹٪)،

انجام گرفته و باید توجه داشت که الگوی مقاومت دارویی باکتری‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج می‌تواند با گذشت زمان تغییر کند.

در درمان پیشنهاد شده از طرف WHO برای ماستیت عفونی، آنتی‌بیوتیک‌های اریتروماسین، فلوکساسیلین، دیکلوكساسیلین، آموکسیسیلین و سفالالکسین گزارش شده است (۱۵).

همان طور که اشاره شد ماستیت در جمعیت‌های مختلف شایع بوده و تعذیه نوزاد از شیر مادر و در نتیجه سلامت نوزاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد لذا پیشگیری از ماستیت در سلامت نوزاد اهمیت به سزاپی دارد. روش‌های شیردهی مناسب از جمله تماس نزدیک مادر و نوزاد، نحوه مناسب در آغوش گرفتن نوزاد هنگام شیردهی، مناسب بودن دفعات و مدت زمان شیردهی راه‌های مناسبی برای جلوگیری از توقف جریان شیر و ایجاد عفونت می‌باشند. در صورت ایجاد عفونت، باکتری‌ها و سایر عوامل عفونی باید به طور مناسب تشخیص داده شده و با عوامل ضد میکروبی مناسب درمان شوند. درمان آنتی‌بیوتیکی باید در کنار روش‌های مناسب شیر دادن به منظور تخلیه کامل شیر به کار رود. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان‌دهنده نقش استافیلوکوک‌اورئوس و سایر استافیلوکوک‌های کوآگولاز منفی در ایجاد ماستیت عفونی می‌باشد.

فراهم شود (از مادران درخواست شد پس از شستشوی پستان با آب گرم و شستشوی دست‌ها با آب و صابون و دور ریختن چند قطره اول شیر، نمونه شیر خود را در لوله‌های استریل جمع آوری کنند). طبق گزارش WHO نمونه‌ای با بیش از 10^4 لکوسیت و بیش از 10^3 باکتری در هر میلی‌لیتر شیر نشان‌دهنده ماستیت عفونی است (۱۵) به همین دلیل در این مطالعه باکتری‌های جدا شده برروی محیط کشت از نظر تعداد کلی برسی شدند. باکتری‌های استافیلوکوک‌اورئوس جدا شده دارای تعداد بیش از 10^3 در هر میلی‌لیتر شیر بودند. اما در مورد استافیلوکوک‌های کوآگولاز منفی از ۵۱ نمونه کشت مثبت، ۲۱ نمونه دارای کلی بیش از 10^3 در هر میلی‌لیتر و در 30 نمونه تعداد کلی‌ها کمتر از 10^3 در هر میلی‌لیتر بود که می‌توان این تعداد کم باکتری را به آلدگی نمونه‌ها با ارگانیسم‌های پوست نسبت داد (۱۵).

طبق گزارش WHO در موارد ماستیت عفونی بهتر است برای انتخاب آنتی‌بیوتیک مناسب نمونه شیر کشت داده شده و حساسیت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌ها تعیین شود (۱۵) لذا در این مطالعه حساسیت و مقاومت استافیلوکوک‌اورئوس نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف سنجیده شد. استافیلوکوک‌اورئوس جدا شده از هر ۵ نمونه همچنین استافیلوکوک‌های کوآگولاز منفی جدا شده از هر ۲۱ نمونه نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های فلوکساسیلین، دیکلوكساسیلین، کلوكساسیلین حساس بودند. لازم به ذکر است که این مطالعه در سال ۸۳-۸۴

Summary

Bacterial Mastitis in Lactating Women Attending Mirzakochackhan Hospital during 2003-2004 and the Sensitivity Pattern of the Involved Bacteria

Ghazisaidi K., Ph.D¹, Fateminasab F., Ph.D², Vatani Sh., M.Sc³, Mohamadi M., M.Sc³, Ghaemi E., Ph.D⁴.

1. Professor, Microbiology and Immunology Department, Gorgan University of Medical Sciences and Health Services, Gorgan, Iran.
2. Assistant Professor of Immunology Department, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3. Master of Science in Microbiology, Pathobiology Department, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4. Associate Professor of Microbiology and Immunology, School of Medicine, Gorgan University of Medical Sciences and Health Services, Gorgan, Iran.

Introduction: Mastitis is an inflammatory condition of the breast and since it is usually associated with lactation , it is usually called lactational mastitis. Two major causes of mastitis are milk stasis and infection. The aim of this study was to evaluate bacterial mastitis in lactating women and to determine the sensitivity pattern of the involved bacteria.

Method: A total of 203 milk samples were taken from puerperal women with clinical symptoms of mastitis attending Mirzakochackkhan Hospital during 2003-2004. Samples were examined by microscopic and cultural methods. After identification of bacteria by biochemical methods, disk diffusion method was used for determination of sensitivity pattern of bacteria.

Results: From 203 samples, 56 samples (27.6%) were culture positive and 147 samples (72 .4%) were negative. Among 56 positive samples, 51 ones (91.1%) were positive for coagulase negative Staphylococcus and 5 samples were positive for Staphylococcus aureus. Among 51 positive samples for coagulase negative Staphylococcus, 21 samples had more than 10^3 bacteria per milliliter. Isolated Staphylococcus aureus from 5 samples and isolated coagulase negative Staphylococcus from 21 samples were sensitive to flucxacilin, dicloxacilin, and cloxacilin.

Conclusion: The results of this study show the role of Staphylococcus aureus. and coagulase negative Staphylococcus in infective mastitis.

Key Words: Mastitis, Staphylococcus aureus, Coagulase negative Staphylococcus

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2007; 14(1): 1-8

References

1. Aabo O, Matheson I, Aursnes I, Horgen M, Lagerlov P, Melby K. Mastitis in general practice. Is bacteriologic examination useful? *Tidsskr Nor Laegeforen* 1990; 110 (16): 2075-7.
2. Bauer AW, Kirby WM, Sherris JC and Truck M. Antibiotic Susceptibility testing by a standardized single disk method. *Am J pathol* 1966; 45(4): 493-6.
3. Editorial: Puerperal mastitis. *Br Med* 1976; 1(6015): 920-1.
4. Fetherston C. Characteristics of Lactation mastitis in a Western Australian Cohort. *Breastfeed Rev* 1997; 5(2): 5-11.
5. Filteau S. Low-Cost intervention to decrease mastitis among lactating women. *Acta paediatr* 2004; 93(9): 1156-8.
6. Foxman B, D'Arcy H, Gillespie B, Bobo J.K, Schwartz K. Lactation Mastitis: Occurrence and Medical Management among 946 Breastfeeding women in the united states. *Am J Epidemiol* 2002; 155(2): 103-14.
7. Giugliani E.R. Common problems during lactation and their management. *J Pediatr (Riog)* 2004; 80(5 suppl): S147-S54.
8. Larsen HS, Mahon CR. Staphylococcus. In: Mahon CR, Manuselis G (Editors), *Textbook of Diagnostic Microbiology*. 1st ed., Philadelphia, WB Saunders Company, 2000; PP330-43.
9. Livingstone V, Stringer LJ. The treatment of staphylococcus aureus infected sore nipples: a randomized comparative study. *J Hum Lact* 1999; 15(3): 241-6.
10. Matheson I, Aursnes I, Horgen M, Aabo D, Melby K. Bacteriological findings and clinical symptoms in relation to clinical outcome in puerperal mastitis. *Acta Obstet Gynecol Scand* 1988; 67(8): 723-6.
11. Michie CA, Gilmour J. Breastfeeding and the

- risks of Viral transmission. *Arch Dis Child* 2001; 84(5): 381-2.
12. Michie CA, Lockie F, lynn W.The Challenge of mastitis. *Arch Dis Child* 2003; 88(9): 818-21.
13. Riordan JM, Nichols FH. A descriptive study of Lactation mastitis in Long- term breastfeeding women. *J Hum Lact* 1990; 6(2): 53-8.
14. Semba RD, Kumwenda N, Hoover DR, Taha TE, Quinn TC, Mtimavalye L *et al.* Human immunodeficiency virus Load in breast milk, mastitis and mother to child transmission of human immunodeficiency virus type 1. *J Infect Dis* 1999; 180(1): 93-8.
15. World Health Organization. Mastitis: Causes and Management. Department of Child and Adolescent Health and Development. WHO/FCH/CAH/00.13.Geneva. 2000; 1-50.