

مقاله پژوهشی

بررسی نگرش پرستاران

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان در مورد آموزش بیمار توسط پرستار بالینی

عصمت نوحی^۱، دکتر محمد تقی یاسمی^۱ و یدا... نیکیان^۱

خلاصه

آموزش بیماران یکی از وظایف مهم پرستاران است. اگر تمایل و ایمان قلبی نسبت به موضوعی (از جمله آموزش بیمار) وجود نداشته باشد عمل به آن اگر غیر ممکن نباشد، بسیار مشکل است. در این پژوهش، جهت پاسخ به این پرسش که نگرش پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد آموزش بیمار توسط پرستار بالینی چگونه است، پرسشنامه‌ای از نوع مقیاسهای افزودنی (لیکرت) مشتمل بر ۲۲ عبارت نگرش سنج، تهیه گردید. روابع ابزار با روش روانی محتوی از طریق کسب نظر از صاحبینزان تعیین گردید و پایابی آن با استفاده از آزمون مجدد و اندازه‌گیری ضربی همبستگی اسپرمن ($r_s = 0.93$) و با روش تعیین ثبات درونی پرسشنامه و اندازه‌گیری ضربی آلفای کرونباخ ($\alpha = 0.88$) مشخص شد و سپس بین کلیه پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعم از آموزشی و بالینی ($n = 108$) توزیع گردید. نتایج حاصل نشان داد در مجموع ۵۲ نفر (۴۸٪) نگرش مثبت (میانگین نمرات بالاتر از ۳) و ۴۷ نفر (۴۳٪) نگرش منفی (میانگین نمرات کمتر از ۳) و ۹ نفر (۸٪) نگرش بی تفاوت نسبت به آموزش بیمار داشتند. با وجود اینکه اکثریت پرستاران (۸۴٪) آموزش بیمار را امری ضروری می‌دانستند، ولی متأسفانه بیشتر آنها (۷۲٪) این وظیفه را امری تخصصی و در حوزهٔ وظایف پزشک بیان نموده‌اند. از بین متغیرهای مورد بررسی، سطح تحصیلات ($P < 0.02$) و نوع خدمت (آموزشی نسبت به بالینی) ($P < 0.001$) با نگرش، رابطه‌ای معنی دار نشان داده‌اند. حال آنکه سن، جنس، تأهل و سابقه کار رابطه‌ای با نگرش نداشتند. این پژوهش ضرورت بازآموزی و تغییر نگرش پرستاران را برای اینکی نقش آموزشگر بیماران نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: آموزش بیمار، پرستار، نگرش

مقدمه

روش بررسی

این پژوهش مطالعه‌ای مقطعی است که شامل تمام پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان (متشكل از بیمارستانها و دانشکده پرستاری) است ($n=108$). اطلاعات از طریق پرسشنامه‌ای جمع‌آوری گردید که شامل دو بخش است:

۱- ویژگیهای دموگرافیک

۲- عبارتهای نگرش سنج که بر مبنای مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت طرح ریزی شده است و پاسخگو، نظرات خود را بصورت (کاملاً موافق، موافق، بین‌نظر، مخالف و کاملاً مخالف) بیان داشته است (برای عبارتهای با بار مثبت به ترتیب نمرات ۵ تا ۱ و در عبارتهای با بار منفی بر عکس نمرات ۱ تا ۵ منظور شده است).

روایی و پایابی پرسشنامه توسط پژوهشگران مشخص گردید. برای تعیین روایی ابزار پژوهش، از روش روایی محتوى (content validity) از طریق کسب نظر از صاحب‌نظران استناده و به منظور تعیین پایابی (reliability)، آزمون مجدد (test-retest) به فاصله ۱۰ روز انجام گرفت و با ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman)، $r=.93$ کسب گردید و همچنین ثبات درونی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ $\alpha=.88$ تعیین شد که مطلوب به نظر می‌رسد. با توجه به این یافته‌ها این امکان فراهم گشت که علاوه بر بررسی تک‌تک پرسشها نمره کل نیز به پرسشنامه داده شود.

تجزیه و تحلیل آماری در مورد بررسی رابطه متغیرها با نمره نگرش، به کمک آنالیز واریانس یکراهه که در برنامه EPI-5 معنوان معادل test-t هنگام مقایسه دو گروه ارائه می‌شود انجام گردید.

یافته‌ها

از ۱۰۸ پرستار، ۹۴ نفر (۸۷٪) زن و ۱۴ نفر (۱۳٪) مرد بودند. میانگین سن آنان ۳۱ سال با انحراف معیار ۶/۷ و دامنه سن آنان بین ۲۱ تا ۵۰ سال بود. تعداد ۷۰ نفر (۶۴/۸٪) متاهل و ۳۸ نفر (۳۵/۲٪) مجرد بودند. از نظر تحصیلات ۶ نفر (۵/۶٪) کارشناس ارشد، ۸۸ نفر (۸۱/۵٪) کارشناس و ۱۴ نفر (۱۳٪) کارداران پرستاری بودند و میانگین سابقه کار $8 \pm 6/4$ سال بوده است. نتایج حاصل نشان داد در مجموع ۵۲ نفر (۴۸/۲٪) نگرش مثبت (میانگین نمرات بالاتر از ۳) و ۴۷ نفر (۴۳/۵٪) نگرش منفی (میانگین نمرات کمتر از ۳) و ۹ نفر (۸/۳٪) نگرش

ارتقاء سطح سلامت نیازمند تغییر شیوه زندگی فرد است. بخش عظیمی از این تغییر با آموزش صورت می‌پذیرد که یکی از اجزاء اساسی مراقبت پرستاری است و به منظور ارتقاء، حفظ و بازیابی سلامتی انجام می‌گیرد (۱). این نقش در دو زمینه اعمال می‌گردد: آموزش بهداشت که به آموزش روش‌های زندگی بهداشتی در سطح جامعه اختصاص می‌یابد و دیگری آموزش بیمار که موجب افزایش آگاهی بیماران در زمینه بیماری خود می‌گردد. نیاز به دانستن و یادگیری یکی از اساسی‌ترین نیازها و فعالیتهای بشر است و این مهم به ویژه در بیماری که دچار ناخوشی یا محدودیت مراقبت از خود شده است محسوس تر است (۸). تأثیر آموزش بیمار در پژوهش‌های مختلف به اثبات رسیده، بطوری که عدم آگاهی کافی بیمار از چگونگی دستورات مراقبتی موجب شکست $\frac{1}{3}$ بیماران در ادامه دستورات پزشکی می‌شود (۴). بیمارانی که در زمان ترجیح، آگاهی و آمادگی لازم جهت مراقبت از خود را کسب نکرده‌اند، قادر تخواهد بود که دوران تناهت را بدون مشکل طی کنند. کسب آگاهی، اضطراب بیماران را کاهش می‌دهد و حسن امثیت و اعتماد به نفس آنها را بالا می‌برد (۶). افزایش آگاهی بیماران فواید دیگری در بر دارد مانند: بهبود کیفیت مراقبت از خود، تسریع بهبودی و پذیرش بهتر مسائل مربوط به بیماری (۹)، کاهش مدت بستری شدن و کاهش نیاز به مصرف داروهای مخدور بعد از عمل (۱۰). آموزش بیمار یکی از فعالیتهای پرستاری و از ابتدایی‌ترین مسؤولیتهای پرستاران محسوب می‌شود و نقش مهمی در فعالیتهای بالینی دارد (۲). با توجه به ضرورت آموزش بیماران و اهمیت نقش آموزش پرستاران، به علت ارتباط بیشتر و نزدیکتر با بیمار یعنوان بهترین منبع ارائه دهنده اطلاعات (۱۰)، لازم است پرستاران نسبت به نیازهای آموزشی بیماران از جمله مشکلات بهداشتی آنها، رژیم غذایی، محدودیت فعالیت، داروهای تجویز شده و فعالیتهای پیشگیری کننده و ... آگاه باشد و آموزش بیماران را به صورت منظم و برنامه‌ریزی شده طبق اصول علمی پایه گذاری نمایند (۷). نگرش پرستاران از عوامل مهمی است که در توسعه و پیشرفت برنامه‌های پرستاری تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد و یکی از عواملی است که در همکاری پژوهشی و ایجاد طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی نقش مؤثری اینا می‌نماید (۳). از آنجاکه نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیمار می‌تواند بر عملکرد مناسب آنها در این زمینه تأثیر بسزایی داشته باشد، لذا این پژوهش ضمن تعیین وضعیت نگرش پرستاران به بررسی عوامل مرتبط با آن می‌پردازد.

جدول ۱: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پرستاران مورد مطالعه بر حسب نحوه پاسخگویی به عبارات نگرش سنج و میانگین و انحراف معیار هر عبارت

ردیف	عبارت نگرش سنج	نگرش	کاملاً موافق									موافق			بی نظر			مخالف			کاملاً مخالف		میانگین	ردیف
			فرارانی درصد																					
۱	در جهت بالا بودن سلامت یمار آموزش آنها امری ضروریست	-	-	-	-	-	-	-	۱۵/۷	۱۷	۸۴/۳	۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴/۸۴	۰/۲۷	
۲	آموزش یمار در کیفیت مراقبتهای پرستاری تأثیر ندارد	۲۶/۹	۲۹	۱۰/۲	۱۱	۵/۶	۶	۲۶/۱	۳۹	۲۱/۲	۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۸۵	۱/۵۵	
۳	آموزش یمار امری شخصی است و در حوزه وظایف پزشک است	۲۷/۸	۳۰	۱/۹	۲	۲/۷	۴	۴۸/۱	۵۲	۱۸/۵	۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۷۲	۱/۵۲	
۴	از آنجاکه مراقبت بطور کامل بهدهد پرستار و پرستن درمانی است نیازی به آموزش مراقبت از خود نیست	۱۴/۸	۱۶	۳۸	۴۱	۲/۷	۴	۱۷/۶	۱۹	۲۵/۹	۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۰۲	۱/۴۹	
۵	آموزش یمار توسط پرستار بالینی در کشور اصلًا عملی نیست	۱۹/۸	۱۶	۱۸/۵	۲۰	۷/۴	۸	۴۸/۲	۵۱	۱۲	۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۷۷	۱/۳	
۶	آموزش یمار را بدلیل آنکه به کار پخش لطمه می‌زنند نباید انجام داد	۲۲/۱	۲۵	۲۲/۱	۲۵	۲/۸	۲	۳۷	۴۰	۱۲/۹	۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۰۵	۱/۴۵	
۷	پرستار باید از محترای آموزش مرتبط با یماری‌های مختلف آگاه باشد	۱۲	۱۴	۱۲	۱۴	-	-	۴۰/۷	۴۴	۲۲/۲	۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۲۱	۱/۳۹	
۸	اصولاً انجام این کار در محیط بیمارستان و بر بالین یمار بین فایده است	۱۹/۴	۲۱	۴۲/۶	۴۶	۵/۶	۶	۱۰/۲	۱۱	۲۲/۲	۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۷۲	۱/۴۶	
۹	پرستار بدلیل فرصت و ارتباط پیشتر با یمار بهتر من توائد این مسؤولیت را بعده بگیرد	۲۱/۳	۲۳	۱۹/۴	۲۱	۱۱/۱	۱۲	۴۰/۶	۴۴	۱۷/۶	۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۴۶	۱/۷۴	
۱۰	بدنیال کسب آموزش مناسب، یمار رضایت پیشتری پیدا می‌کند	۱۷/۸	۱۱	۷/۴	۸	۲/۷	۴	۳۵/۲	۳۸	۳۶/۱	۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۶۶	۱/۲۴	
۱۱	آموزش، یماران را خسته می‌کند	۲/۸	۲	۱۸/۸	۱۶	۲۲/۱	۲۵	۳۹/۸	۴۴	۱۹/۴	۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۵۸	۱/۱۵	
۱۲	آموزش یمار، پرستاران را خسته می‌نماید	۱۲	۱۴	۲۵/۲	۳۸	۱۶/۷	۱۸	۲۶/۹	۲۹	۹/۲	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۱۴	۱/۲۱	
۱۳	آموزش یمار توسط پرستار توهین به پزشک است	۲۵/۹	۲۸	۱۷/۶	۱۹	۲/۷	۴	۴۰/۷	۴۴	۱۲	۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۰۵	۱/۴۶	
۱۴	آموزش یمار رابطه پرستار و یمار را صمیمانه تر می‌نماید	۲۰/۴	۲۲	۲۸/۷	۳۱	۱۵/۷	۱۷	۲۷/۸	۳۰	۷/۴	۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۷۷	۱/۲۷	
۱۵	کسانی که می‌خواهند این وظیفه را به پرستار واگذار نمایند قصد تحمل یک کار جدید به او را دارند	۲۱/۵	۲۴	۳۱/۵	۴۴	۵/۶	۶	۱۵/۷	۱۷	۱۵/۷	۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۰۲	۱/۷۷	
۱۶	من به پرستارانی که به یمار آموزش می‌دهند احترام می‌گذارم	۲۱/۳	۲۳	۳۹/۸	۴۳	۱/۹	۲	۳۰/۶	۳۳	۶/۵	۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۴۹	۱/۳۰	
۱۷	اگر یمار را آموزش دهم برای ادامه کار سرحتار هستم	۱۷/۸	۱۱	۳۸	۴۱	۱۶/۸	۱۸	۲۲/۱	۲۵	۹/۶	۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۵۸	۱/۱۶	
۱۸	بدلیل ضرورت آموزش یمار، این کار را در اولویت فعالیت‌های قرار می‌نمایم	۱۰/۲	۱۱	۵۱/۹	۵۶	۱۶/۷	۱۸	۴/۶	۵	۱۶/۷	۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۶۶	۱/۲۴	
۱۹	من وقت زیادی را صرف صحبت با هر اهان یمار در مورد چنگوئی می‌گذرانم	۲۰/۴	۲۲	۱۸/۰	۲۰	۲۷/۸	۳۰	۲۰/۴	۲۲	۱۲	۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۸۷	۱/۷۳	
۲۰	روتی یمار راجع به کسالت خود از من سوال می‌کند، می‌گویم وظیفه من فقط مراقبت از شماست	۲۸/۷	۲۱	۴۲/۶	۴۶	۲/۷	۴	۲۰/۴	۲۲	۹/۶	۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۴۰	۱/۲۲	
۲۱	یکی از دلایلی که مطالعه می‌کنم آماده شدن برای آموزش به یمار است	۱۰/۲	۱۱	۷/۴	۸	۸/۲	۹	۶۱/۱	۶۶	۱۲	۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۴۱	۱/۱۳	
۲۲	در شرایط فعلی ایران آموزش یمار توسط پرستار بالینی امری ضروریست	۱۹/۴	۲۱	۴۶/۳	۵۰	۲/۷	۴	۲۱/۳	۲۳	۹/۳	۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۵۵	۱/۲۸	

مطالعه) نشانگر آن است (با در نظر گرفتن بار پرسشها و نمرات حاصل از پاسخ به عبارتهای نگرش سنج) که در مجموع پرستاران مورد بررسی با ۴۸/۲٪ موافقت و ۴۳/۵٪ مخالفت نگرش نسبتاً مطلوبی در مورد آموزش بیمار توسط پرستار بالینی ندارند. با بررسی تک تک عبارتهای نگرش سنج مشخص گردید که احتمالاً این مسأله می تواند ناشی از عدم اعتقاد به این نکته باشد که آموزش بیمار از وظایف حتمی و مستقل کادر پرستاری است. با وجود آنکه اکثریت آنها به اهمیت امر آموزش معتقدند و آموزش بیمار را امری ضروری دانسته اند، اما آموزش رسمی و منظم بیمار را، امری تخصصی و در حوزه وظایف پزشک بیان نموده اند و اصولاً آموزش بیمار را در محیط بیمارستان، بی فایده ذکر کرده اند. همچنین بیش از نیمی از آنها انجام این امر توسط پرستار را توهین به پزشک دانسته اند و برخی این مسأله را تحمیل یک وظیفه جدید به پرستار ذکر نموده اند. مشخص گردید که با افزایش میزان تحصیلات، نگرش نسبت به آموزش بیمار مثبت تر می شود و نگرش پرستاران آموزشی بهتر از پرستاران بالینی است؛ این امر می تواند بعلت دانش تخصصی بیشتر این گروه و یا بعلت درگیر نبودن آنها در کار پراسترس و وقت گیر بالینی باشد. در پایان اميد است نتایج این تحقیق برانگیزندۀ مدیران و برنامه ریزان پرستاری در شناسایی موانع و مشکلات ضمن کار و بهتر شدن هرچه بپر ایعاد مختلف فعالیت پرستاری خصوصاً بعد آموزشی آن باشد. این پژوهش نشان می دهد که نیاز به بازآموزی و تغییر نگرش پرستاران بخصوص پرستاران بالینی در مورد اینها نقش آموزشگر بیمار وجود دارد.

Summary

Attitude of Nurses of Kerman University of Medical Sciences Toward Patient Teaching by Clinical Nurses
S. Nouhi, MS¹; MT. Yasamy, MD¹; and Y. Nikian, MS¹

1. Faculty Member, Kerman University of Medical Sciences and Health Services, Kerman, Iran

Teaching patients is one of the most essential element in nursing practice. Lack of enthusiasm and belief in a task such as teaching patients would render it difficult, if not impossible. In this research, a summative scale (likert) questionnaire consisting of 22 items was prepared to assess the attitude of all nurses (n=108) in Kerman University of Medical Sciences. Content validity was improved after consulting available experts in the field. The reliability of research instruments were determined by a test-retest, using Spearman correlation coefficient. Internal consistence of the questionnaire was ascertained by Cronbach, (r=0.88). Overall, fifty two of the subjects (48.2%) had a positive attitude (mean score higher than 3), forty seven (43.5%) had a negative attitude (mean score lower than 3) and nine (8.3%) were indifferent toward educating patients. Although, the majority of nurses considered teaching patients an important

بی تفاوت نسبت به آموزش بیمار دارند. از نظر میزان موافقت و مخالفت با عبارتهای نگرش سنج، بیشترین موافقت حاصل از جمع موارد کاملاً موافق و موافق (۱۰۰٪) با عبارت "در جهت بالابردن سلامت بیماران آموزش آنها امری ضروری است" و بیشترین مخالفت حاصل از جمع موارد کاملاً مخالف و مخالف (۷۱/۳٪) با عبارت "وقتی بیمار راجع به کسالت خود از من سوال می کند می گویم وظیفه من فقط مراقبت از شما است" بوده است (جدول ۱). در بررسی رابطه عواملی نظریه سن، جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، نوع خدمت و سابقه کار با نگرش پرستاران مورد مطالعه، تحصیلات ($F=2/39$, $P<0.02$) با ضریب رگرسیون $=0.22$ و با ۹۵٪ دامنه اطمینان ($F=2/32$, $P<0.02$) و نوع خدمت (آموزشی نسبت به بالینی) ($F=27/949$, $P<0.0002$) با نگرش رابطه معنی دار آماری با نگرش نشان ندادند.

بحث و نتیجه گیری

امروزه نیاز به آموزش بیمار کاملاً درک می شود، ولی مسائل مربوط به اینکه چه گروههایی از بیماران باید مورد آموزش قرار گیرند، چه چیزی باید آموزش داده شود و چه کسی باید آموزش دهد و بالاخره بازدهی و تأثیر آن را چگونه باید ارزیابی نمود مواردی هستند که هنوز لایحل باقی مانده اند (۵).

نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش در رابطه با هدف اول پژوهش (تعیین نگرش پرستاران مورد

task, most of them (72%) regarded this duty as special task to be done by physicians. Among the study variables, educational level ($P<0.02$) and type of the service (educational vs clinical) ($P<0.001$) had a significant relationship with positive attitude, while gender, marital status and length of career had no correlation. The results from this project underscores the necessity of change of attitude and reeducation of nurses to have a role in teaching patients.

Journal of Kerman University of Medical Sciences 1995; 2(3): 149-153

Key Words: Teaching patients, Nurse, Attitude

References

1. Baras D. The nurse as patient educator. *Br J Nurs* 1992; 1: 241-245.
2. Brunner S, Sudarth S: Text book of medical surgical nursing. Philadelphia, JB Lippincott Co, 1992; pp44-48
3. Eckerling S, Bergman R, Bar-Tal Y: Perception and attitudes of academic nursing students to research. *J Adv Nurs* 1988; 13(6): 759-767.
4. Gillum RF. Patient education. *J Natl Med Assoc* 1974; 66(2): 156-159.
5. Johns JL: Self care today in search of an identity. *Nurse Health Care* 1985; 6: 153-155.
6. Murry B, Zenthner P: Nursing assessment and health promotion through the life,
- London, Prentic Hall, 1985; pp184-185.
7. Phipps W, Long B, et al: Medical surgical nursing, a nursing process approach. St. Louis, The Mosby Co, 1987; pp191-192.
8. Potter P, Perry A: Fundamentals of nursing concepts, process and practice. St Louis, The CV Mosby Co, 1993; 304-305.
9. Royle J, Walsh M: Watson's medical surgical nursing and related to physiology. London, Bailliere Tindall Co. 1992.
10. Vanhozer H: The teaching process theory and practice in nursing. Norwalk, Appleton-Century Crofts Co. 1987; p2.
11. Wilson BJ: Principles of patient teaching. *Nurs Times* 1985; 81(8): 28-29.